



# Levobupivakain inf 2,5 mg/mL

(fd Chirocaine, licens) sårkateter

**Får INTE ges intravenöst (intravasalt).**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Levobupivakain infusionsvätska 2,5 mg/mL (ex Levobupivacaine Fresenius Kabi, licens)

## INGEN SPÄDNING

INF  
**2,5 mg/mL**  
flera volymer finns

## ADMINISTRERING

Sårkateter infusion: bolusdos

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Levobupivakain (licensprodukt)

2,5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Bruten förpackning: Får ej sparas, används direkt. Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska endast ordineras av läkare med god kännedom om komplikationsrisker, övervakning och säkerhetsåtgärder. Följ lokal rutin.

### Postoperativ smärtlindring vid bentransplantation

Barn 1 mån - 18 år: 5 - 10 mg x 4 (- 6) ( 2 - 4 mL x 4 (- 6))

## ÖVRIG INFORMATION

Levobupivakain har (liksom ropivakain) längre effektduration och något längre anslagstid än många andra lokalanestesimedel. Vid behov av mer snabbverkande/kortverkande lokalanestesimedel är lidokain att föredra.

## REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2833](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2833)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 2833

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-11-15

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**