



Pyridoxin intravenös inj 150 mg/mL

(Vitamin B6, Extempore)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionslösning pyridoxin APL 150 mg/mL, behöver ej spädas (extempore)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion (3 - 5 min)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Pyridoxinhydroklorid (extempore - lagervara)

150 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Sparas ej efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Neonatal epileptisk encefalopati eller terapiresistent epilepsi under första 3 levnadsåren inkl. infantil spasm/West syndrom

- av oklar orsak

- efter perinatal asfyxi eller prematuritet, svårbehandlad

Provbehandling vid status epileptikus eller hypsarytmi:

Nyfödda: 100 - 150 mg

Barn 1 mån - 3 år: 100 - 150 mg

Vid utebliven effekt kan dosen upprepas var 5:e - 10:e minut upp till en total dos av 500 mg. Därefter peroral behandling (se annan instruktion).

Ges under EEG registrering.

OBS! Risk för plötslig grav hypotension (devitalisering) och/eller andningsdepression. Beredskap för detta ska finnas.

Akut metabol sjukdom, misstänkt metabol kris

Barn 1 mån - 18 år: 50 mg x 2

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Zschocke J, Hoffmann GF. Vademecum metabolicum, diagnosis and treatment of inborn errors of metabolism. Tredje utgåvan 2011.

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2847



Pyridoxin intravenös inj 150 mg/mL

(Vitamin B6, Extempore)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-09-30

ePedID: 2847

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-02

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-10-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT