

Synacthen Depot, IM inj  
Tetrakosaktid 1 mg/ml

---

Beredningsinstruktion: Ampullen ska skakas före användning.  
Ljuskänsligt, förvaras i kartongen.  
Förvaras i kylskåp.

Administrering: Intramuskulär injektion

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas.;

Varunummer: 158972, Synacthen Depot inj 1mg/ml, 10 x 1 ml

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt lokala läkemedelshanteringsriktlinjer

---

Indikation: Infantila spasmer

Vanlig dos: Barn under 2 år: 0,25 mg = 0,25 ml intramuskulärt varannan dag. Dosen kan höjas till 0,5 mg om behov föreligger dag 5 och 7. Se Pm för vidare info om behandlingstid och uttrappning.

---

Kommentar: Observans på hjärt- och blodtryckspåverkan, elektrolytrubbning, infektionskänslighet, nedsatt glukostolerans och gastrit/ulcus.

Referens - Det blåa fältet innehåller klickbar länk till referensen

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus: Behandling av infantila spasmer

<http://eamianuti.karolinska.se/upload/Bammet%203/080826Behandling%20av%20infantila%20spasmer.pdf>