

Amiodarone/Cordarone IV inj, IV inf 15 mg/mL CENTRAL infart

Amiodarone

En-stegsspädning:	Cordarone		Glukos 50 alt 100 mg/mL		INJ-INF LÖ
	50 mg/mL	+		=	15 mg/mL
	3 mL		7 mL		10 mL

Beredningsinstruktion

Får endast spädas med glukos 50 mg/ml.

Hållbarhet preparat:

Cordarone (Registrerad Produkt)

- 50 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Sparas inte efter första uttag.
- 15 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning, Hållbar: Ljuskänsligt. 12 tim rumstemperatur.

Administreringsätt

Neo: Intravenös infusion 30 min i central infart.

Barn: Intravenös eller intraosseös injektion under minst 3 min. Får ej upprepas förrän 15 min efter första injektionen.

Alternativt som intravenös infusion enligt anvisning, då kan en svagare styrka vara lämplig att använda.

Infusion i perifer ven kan orsaka smärta och inflammation.

Vanlig indikation och dos

Hjärtarytmi - IV administrering initialt vid behov av snabb effekt - ordineras i samråd med barnkardiolog

5 mg/kg, kan upprepas initialt om ej effekt, herefter 2,5 - 5 mg/kg x 1 -2.
Övergå till PO underhållsdosering snarast möjligt.

Ventrikelflimmer eller persisterande ventrikeltachykardi som inte svarar på defibrillering.

Barn: 5 mg/kg intravenöst. Max 300 mg

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-08-25 14:01:18

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-08-26 10:12:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2853

ID/spårnummer: 796

Giltig fr o m: 2015-08-26 10:12:23

Utskriftsdatum: 2015-08-26

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Amiodarone/Cordarone IV inj, IV inf 15 mg/mL CENTRAL infart

Amiodarone

Allvarlig symtomgivande ventrikulär och supraventrikulär takarytmi i samband med WPW, förmaksfladder/flimmer

Bolusdos: 5 mg/kg under 30 - 120 min

Därefter underhållsdos 7,5 - 15 mikrogram/kg/min under 12 - 24 timmar.

För kontinuerlig infusion behöver preparatet spädas vidare.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2,5 mg/kg/dos	0,17 mL	0,8 mL	1,7 mL	8,3 mL
5 mg/kg/dos	0,33 mL	1,7 mL	3,3 mL	16,7 mL

Övrig information

Ska ordineras i samråd med barnkardiolog.

Cordarone i koncentration över 2 mg/mL ska administreras i central infart.

Cordarone ska inte användas om arytmin orsakats av förgiftning, exempelvis med tricykliska antidepressiva.

Intravenösa beredningar med amiodarone innehåller bensylalkohol.

Referens/Länk

Akutpediatrikboken 2010 omslagets insida, Hämtat: 2012-09-15

FASS , Hämtat: 2015-08-25

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-08-25

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Trissel Book on Injectable Drugs , Hämtat: 2015-08-25

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus PM Återupplivning, Hämtat: 2015-08-17

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/IDFF00016740F9A478C1257A2A0040BDA0?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Cordarone = Amiodarone 50 mg/ml (BIVAs ESR), Hämtat: 2015-08-20

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/IDEC44842F7D3E6A2DC1257B980031CE25?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-08-25 14:01:18

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-08-26 10:12:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2853

ID/spårnummer: 796

Giltig fr o m: 2015-08-26 10:12:23

Utskriftsdatum: 2015-08-26

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

