



Loratadin oralt 1 mg/mL

(Clarityn) sirap

ADMINISTRERINGSSÄTT

Kan tas utan hänsyn till måltid.
Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Loratadin (registrerad produkt)

1 mg/mL, Sirap

HÅLLBAR: Öppnad förpackning hållbar 1 månad. Ljuskänsligt. Förvara flaskan i ytterkartongen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Barn 1 mån - 2 år: 5 mg x 1	(5 mL)
Barn över 2 år, vikt under 30 kg: 10 mg x 1	(10 mL)
Barn över 30 kg: 20 mg x 1	(20 mL)

Då dessa doser är högre än de i FASS angivna bör recept märkas med OBS

Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn 1 mån - 2 år: 2,5 mg x 1	(2,5 mL)
Barn över 2 år, vikt under 30 kg: 5 mg x 1	(5 mL)
Barn över 30 kg: 10 mg x 1	(10 mL)

Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn 1 mån - 2 år: 2,5 mg x 1	(2,5 mL)
Barn över 2 år, vikt under 30 kg: 5 mg x 1	(5 mL)
Barn över 30 kg: 10 mg x 1	(10 mL)

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger.

ÖVRIG INFORMATION

Patienten bör observeras i minst 1 timme vid begränsad allergisk reaktion och 4 timmar vid anafylaxi, grad 1.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-01-21

ePedID: 2862

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-02-25

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-02-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT