



# Loratadin oralt 1 mg/mL

(Clarityn) sirap

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Kan tas utan hänsyn till måltid.  
Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Oralt

Enteralt i sond

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Loratadin (registrerad produkt)

1 mg/mL, Sirap

HÅLLBAR: Öppnad förpackning hållbar 1 månad. Ljuskänsligt. Förvara flaskan i ytterkartongen.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Barn 1 mån - 2 år: 5 mg x 1	(5 mL)
Barn över 2 år, vikt under 30 kg: 10 mg x 1	(10 mL)
Barn från 30 kg: 20 mg x 1	(20 mL)

Då dessa doser är högre än de i FASS angivna bör recept märkas med OBS.

### Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn 1 mån - 2 år: 2,5 mg x 1	(2,5 mL)
Barn över 2 år, vikt under 30 kg: 5 mg x 1	(5 mL)
Barn från 30 kg: 10 mg x 1	(10 mL)

### Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn 1 mån - 2 år: 2,5 mg x 1	(2,5 mL)
Barn över 2 år, vikt under 30 kg: 5 mg x 1	(5 mL)
Barn från 30 kg: 10 mg x 1	(10 mL)

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger.

## ÖVRIG INFORMATION

Patienten bör observeras i minst 1 timme vid begränsad allergisk reaktion och 4 timmar vid anafylaxi, grad 1.

Dosreducera vid allvarligt nedsatt leverfunktion.

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



# Loratadin oralt 1 mg/mL

(Clarityn) sirap



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-03-17

ePedID: 2862

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-17

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-03-17

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**