

Loratadin oralt 10 mg

(ex Clarityn) tablett

Administreringsätt

Oralt: Tabletten kan tas utan hänsyn till måltid.
Tabletten kan delas i två delar för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge mindre dos.

Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Vanlig indikation och dos

Allergi och urtikaria.

Barn över 30 kg: 10 mg (1 tabl) x 1

Allergisk reaktion i samband med provokation eller vaccination

Barn 6 - 12 år: 10 mg (1 tabl)

Barn över 12 år: 10 - 20 mg (1 - 2 tabletter)

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2863

Substansspecifika uppgifter

Loratadine, R06AX13

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POFGUAZDNVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-01 11:36:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 14:11:47

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2863

ID/spårnummer: 3290

Giltig fr o m: 2017-06-02 14:11:47

Utskriftsdatum: 2017-06-02

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

