



Loratadin oralt 10 mg

(ex Clarityn) tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 10 mg (ex Loratadin Sandoz)
Tablett 10 mg (ex Clarityn)

Till små barn och vid administrering via sond rekommenderas sirap, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletten kan tas utan hänsyn till måltid.
Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Tabletten kan delas i två delar för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge mindre dos.

Munsönderfallande tabletter kan tas utan vatten och är bra i akuta situationer eller till barn som inte kan svälja vanliga tabletter, men kostnaden är högre för munsönderfallande tabletter.

Enteralt i sond: för administrering i sond rekommenderas sirap, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Loratadin (registrerad produkt)

10 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

10 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Barn upp till 2 år: dosering se annan instruktion.

Barn över 2 år, vikt under 30 kg: 10 mg x 1

Barn från 30 kg: 20 mg x 1

Då dessa doser är högre än de i FASS angivna bör recept märkas med OBS.

Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn under 30 kg: dosering, se annan instruktion.

Barn 6 - 18 år, vikt över 30 kg: 10 mg x 1

Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn under 6 år: dosering, se annan instruktion.

Barn 6 - 18 år: 10 mg x 1

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger.

ÖVRIG INFORMATION

Patienten bör observeras i minst 1 tim vid begränsad allergisk reaktion och 4 tim vid anafylaxi, grad 1.

Dosreducera vid allvarligt nedsatt leverfunktion.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2863



Loratadin oralt 10 mg (ex Clarityn) tablett



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-03-17

ePedID: 2863

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-17

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT