

# Midazolam extempore PO, PR

Midazolam

**OBS! Flera styrkor och beredningsformer finns.**

Färdigberedd extemporelösning (rektal eller oral) från apoteket.

---

**Administreringsätt**

Oralt: Anslagstid: 15 - 30 minuter

Rektalt: Anslagstid: 10 - 30 minuter

---

**Vanlig indikation och dos**

Premedicinering 20 min innan ingrepp.

Oralt: 0,3 - 0,75 mg/kg, max 10 mg/dos

Rektalt: 0,25 - 0,5 mg/kg, max 10 mg/dos

---

**Övrig information**

Har endast sederande effekt, ej analgetisk. Ej lämpligt att ge till redan agiterade barn.

Duration: 60 - 90 minuter.

Detta blad gäller för extemporepreparat Midazolam oral lösning 1 mg/mL, rektal lösning 1 mg/mL resp. 3 mg/mL.

---

**Referens/Länk**

BNF-C , Hämtat: 2014-10-16

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2014-10-16

[http://online.lexi.com/crisql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh\\_f&mn=&id=](http://online.lexi.com/crisql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=)

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2014-10-16

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-31 11:03:34

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-31 11:03:31

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2865

ID/spårnummer: 615

Giltig fr o m: 2015-03-31 11:03:34

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

