

Läkemedel för injektion eller infusion

Vfend, IV inf (Obs 2 steg)

Vorikonazol 5 mg/ml

enl spädn-schema

Alla nedanstående alternativ ger Vorikonazol 5 mg/ml (Obs 2 steg). Välj lämplig slutvolym och iordningställ enligt instruktionerna

 Alternativ 1: Spädes från Vfend 200 mg pulver

Spädes från: Vfend pulv t inväts 200mg Pfi

	<i>inf subst</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1	pulver		sterilt vatten	10 mg/ml
	200 mg	+	19 ml	= 20 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inf</i>
steg 2	10 mg/ml		glukos 50 mg/ml alt NaCl 9 mg/ml	5 mg/ml
	20 ml	+	20 ml	= 40 ml

 Alternativ 2: Spädes från Vfend 2 x 200 mg pulver

Spädes från: Vfend pulv t inväts 200mg Pfi

	<i>inf subst</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1	pulver		sterilt vatten	10 mg/ml
	400 mg	+	38 ml	= 40 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inf</i>
steg 2	10 mg/ml		glukos 50 mg/ml alt NaCl 9 mg/ml	5 mg/ml
	40 ml	+	40 ml	= 80 ml

Beredningsinstruktion: Kasta Vfendflaskan om lösningsmedlet inte dras in i flaskan med hjälp av vakuum.

Administrering: Infunderas intravenöst under 1 - 3 timmar (max 3 mg/kg/timme).
Obs! Ska inte infunderas samtidigt i samma infart som andra infusionslösningar.

Hållbarhet efter iordningställande: Stamlösning får INTE sparas pga förväxlingsrisk.

Färdigberedd infusionslösning ska förbrukas omgående och överbliven lösning kastas.;

Varunummer: 10326, Vfend pulv t inväts 200mg Pfi, 200 mg

Vfend, IV inf (Obs 2 steg)

Vorikonazol 5 mg/ml

enl spädn-schema

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt lokala läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Invasiva mykoser inkl. aspergillos.

Vanlig dos: Barn 2 - 12 år: 7 mg/kg x 2 (vid intolerans 4 mg/kg x 2) i max 6 månader

Barn 12 - 18 år: Dygn 1: 6 mg/kg x 2

Dygn 2 och framåt: 4 mg/kg x 2 (vid intolerans 3 mg/kg x 2) i max 6 månader

Kommentar: Elektrolytrubbningar såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi ska följas och korrigeras (om nödvändigt) innan man påbörjar samt under behandling med voriconazol
