

Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend)

Två-stegsspädning

steg1	Vorikonazol 200 mg 1 st	+	Sterilt Vatten 19 mL	=	Stamlösning 10 mg/mL 20 mL
steg2	Stamlösning 10 mg/mL 20 mL	+	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 mg/mL 20 mL	=	INF 5 mg/mL 40 mL

Beredningsinstruktion: Kasta flaskan om lösningsmedlet inte dras in i flaskan med hjälp av vakuüm. Vid upplösning av pulvret ska flaskan roteras försiktigt, skaka inte. Endast klar lösning utan partiklar ska användas.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Skyddsinformation saknas i FASS

Administreringsätt

Intravenös infusion: Ges under 1 - 3 timmar (max 3 mg/kg/timme).

Obs! Ska inte infunderas samtidigt i samma infart som andra infusionslösningar.

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-10-03 08:53:12
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-11 11:06:11
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2872
ID/spårnummer: 1597
Giltig fr o m: 2016-10-11 11:06:11
Utskriftsdatum: 2016-10-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL

(ex Vfend)

Invasiva mykoser inkl. aspergillos.

Barn under 50 kg, ca 2 - 12 år:

Dygn 1: 9 mg/kg x 2

Från dygn 2: 8 mg/kg x 2

Vid behov kan dosen justeras uppåt eller nedåt stegvis med 1 mg/kg/dos, t.ex. vid otillräckligt svar eller om patienten inte tolererar behandlingen.

Barn över 50 kg, ca 12 - 18 år:

Dygn 1: 6 mg/kg x 2.

Från dygn 2: 4 mg/kg x 2, om patienten inte tolererar dosen kan den minskas till 3 mg/kg x 2

Behandlingstid: max 6 månader

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
4 mg/kg				40 mL
8 mg/kg	1,6 mL	8 mL	16 mL	

Hållbarhet preparat:

Vorikonazol (Registrerad Produkt)

 10 mg/mL, Stamlösning

Hållbar: Stamlösning får INTE sparas pga förväxlingsrisk.

 5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar: 24 timmar i kylskåp (2 - 8° C)

Övrig information

Elektrolytrubbningar såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi ska följas och korrigeras, om nödvändigt, innan man påbörjar samt under behandling med vorikonazol.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-10-03

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2016-10-03

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2016-10-03

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade**Substansspecifika uppgifter**

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-10-03 08:53:12
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-11 11:06:11
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2872
ID/spårnummer: 1597
Giltig fr o m: 2016-10-11 11:06:11
Utskriftsdatum: 2016-10-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend)

Voriconazole, J02AC03

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POI8UC9QQVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-10-03 08:53:12
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-11 11:06:11
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2872
ID/spårnummer: 1597
Giltig fr o m: 2016-10-11 11:06:11
Utskriftsdatum: 2016-10-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

