

# Heparin intravenös inf 100 E/mL

## för kontinuerlig inf

OBS! 100 enheter/mL fås genom spädning av 5000 enheter/mL

<b>En-stegsspädning:</b>	Heparin LEO		NaCl 9 mg/mL		INJ INF
	5000 E/mL	+		=	<b>100 E/mL</b>
	5 mL		245 mL		250 mL

### Administreringssätt

Barn: Intravenös infusion

### Vanlig indikation och dos

#### Venös trombos och lungemboli.

Vid start av heparininfusion: Bolusdos 75 E/kg under 10 min följt av underhållsdos:

Barn under 1 år: 28 E/kg/timme iv

Barn över 1 år: 20 E/kg/timme iv

Efter 4 timmar styrs behandlingen utifrån APTT nivå.

#### Trombosprofylax efter levertransplantation

Ingen bolusdos.

8,5 E/kg/timme som kontinuerlig infusion. Detta motsvarar 200 E/kg/24 timmar eller 100 E/kg/12 timmar.

Transplantationsjour belsutar när infusionen kan starta postoperativt. Behandling fortgår till dess att patienten är fullt mobiliserad, ca 7 - 10 dagar.

### Hållbarhet preparat:

Heparin LEO (Registrerad Produkt)

100 E/mL, Injektion Infusion (egen beredning)

Hållbar: Droppet måste bytas var 12:e timme pga kontaminationsrisk

5000 E/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Se förpackningen

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-08-21 16:08:50

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-06-16 11:15:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2876

ID/spårnummer: 744

Giltig fr o m: 2015-06-16 11:15:21

Utskriftsdatum: 2016-01-26

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Heparin intravenös inf 100 E/mL för kontinuerlig inf

---

### Övrig information

Vid trombosprofylax efter levertransplantation  
- Vid antitrombin under 0,6 kE/L finns otillräcklig effekt av heparininfusionen och substitution med antitrombin kan övervägas. Diskutera med Barnkoagulation/koagulation.

Kontakt rekommenderas med Barnkoagulationscentrum 08-517 751 20 alt. Koagulationsjouren via vxl 08-517 700 00.

Ordinera kontinuerlig infusion per 24 timmar i TakeCare.

---

### Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus PM/Riktlinjer för HEPARIN infusion till barn och ungdomar, Hämtat: 2012-09-15

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vvWebbLookup/IDFBDBF3FD79FAFA35C1257AAD004E47EB?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Trombos och lungemboli inkl sinustrombos (ej stroke), Hämtat: 2012-09-15

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID901FC950E4A20F08C1257A8C00308B8A?OpenDocument>

---

### Substansspecifika uppgifter

Heparin, B01AB01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POEDUA54BVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-08-21 16:08:50  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-06-16 11:15:21  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2876  
ID/spårnummer: 744  
Giltig fr o m: 2015-06-16 11:15:21  
Utskriftsdatum: 2016-01-26

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

