

Darbepoetin alfa, intravenös, subkutan inj (Aranesp)

Denna instruktion gäller för både förfylld injektionspenna och förfylld injektionsspruta. Observera att injektionspennan endast får administreras subkutan.

Administreringsätt

Subkutan injektion: Rekommenderas för patienter som EJ står på hemodialys för att undvika att perifera vener punkteras.

Intravenös injektion (snabb 10 - 15 sek): Rekommenderas för patienter på hemodialys för att minimera risken för att utveckla neutraliserande antikroppar. Patientens dos kan spädas med ca 5 mL NaCl 9 mg/mL för att underlätta administrering. Endast förfylld spruta ska användas, ej pennan.

Vanlig indikation och dos

Renal anemi

Står på dialys:

Startdos: 0,45 mikrogram/kg var 7:e dag

Underhållsdos: Ges varje eller varannan vecka.

Övergång från dosering en gång i veckan till varannan vecka kräver initialt dubblerad dosering.

EJ står på dialys:

Startdos: 0,45 mikrogram/kg var 7:e dag alternativt kan 0,75 mikrog/kg ges subkutan var 14:e dag.

När hemoglobinnivån uppnåtts med dosering varann vecka kan Aranesp ges subkutan en gång per månad. Startdosen ska då vara dubbelt så hög som den dos som tidigare gavs varannan vecka.

Från 11 år: När hemoglobinnivån uppnåtts med dosering varann vecka kan Aranesp ges subkutan en gång per månad. Startdosen ska då vara dubbelt så hög som den dos som tidigare gavs varannan vecka.

Hållbarhet preparat:

Aranesp (Registrerad Produkt)

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2016-09-19 13:55:29
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-20 14:41:19
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2885
ID/spårnummer: 1517
Giltig fr o m: 2016-09-20 14:41:19
Utskriftsdatum: 2016-09-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Darbepoetin alfa, intravenös, subkutan inj (Aranesp)

- Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna
Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8° C). Ljuskänsligt. När pennan har tagits ut ur kylskåpet och uppnått rumstemperatur (upp till 25 °C), måste den antingen användas inom 7 dagar eller kasseras.
- Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8° C). Ljuskänsligt. När sprutan har tagits ut ur kylskåpet och uppnått rumstemperatur (upp till 25 °C), måste den antingen användas inom 7 dagar eller kasseras.

Övrig information

OBS! skaka inte lösningen, risk för inaktivering av substansen.

Innan administrering låt den förfyllda injektionspennan/sprutan ligga tills den uppnår rumstemperatur.

Kan ges mer sällan än erythropoetin men kan orsaka smärta vid sc inj.stället.

Om hemoglobinnivån inte ökar tillräckligt kan dosen justeras med ungefär 25 %. Dosökning kan göras max en gång var fjärde vecka.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-08-29

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnflegacy/current/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus CKD - Kronisk njursjukdom hos barn, ALB, Hämtat: 2015-06-23

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID997D0DC93F771448C1257C7C0054203D?OpenDocument>

Pediatric Injectable Drugs , Hämtat: 2015-08-19

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-06-30

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

FASS Aranesp, Hämtat: 2015-06-23

<http://www.fass.se/LIF/product?22&userType=2&nplld=20041018000174&docType=6>

Personlig kontakt Amgen, Hämtat: 2015-08-21

Substansspecifika uppgifter

darbepoetin alfa, B03XA02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDF4POJNUJIG2LVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-09-19 13:55:29
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-20 14:41:19
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2885
ID/spårnummer: 1517
Giltig fr o m: 2016-09-20 14:41:19
Utskriftsdatum: 2016-09-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

