

Darbepoetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp) förfylld penna resp spruta

Skaka inte lösningen, risk för inaktivering av substansen.

Instruktionen gäller för: Förfylld injektionspenna och förfylld injektionsspruta. Observera att injektionspennan endast får administreras subkutant.

Administreringsätt

Innan administrering, låt pennan/sprutan ligga tills den uppnår rumstemperatur.

Skaka inte lösningen, risk för inaktivering av substansen.

Subkutan injektion:

Rekommenderas i första hand då det ger något bättre effekt. Lämpligt för de patienter som saknar central infart eftersom eventuell punktering av perifer ven undviks. Förfylld spruta eller penna kan användas.

Intravenös injektion:

Patientens dos kan spädas med ca 5 mL NaCl 9 mg/mL för att underlätta administrering. Endast förfylld spruta ska användas, ej pennan. Ges under 1- 3 minuter.

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-15 08:50:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-15 16:25:09
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2885
ID/spårnummer: 3544
Giltig fr o m: 2017-08-15 16:25:09
Utskriftsdatum: 2017-08-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Darbepoetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp) förfylld penna resp spruta

Renal anemi

Dialyspatient:

Startdos: 0,45 mikrogram/kg var 7:e dag

Underhållsdos: Ges varje eller varannan vecka.

Övergång från dosering en gång i veckan till varannan vecka kräver initialt dubblerad dosering.

Övriga patienter:

Startdos: 0,45 mikrogram/kg var 7:e dag alternativt kan 0,75 mikrog/kg ges subkutant var 14:e dag.

När önskad hemoglobinnivå uppnåtts med dosering varannan vecka kan Aranesp ges subkutant en gång per månad. Startdosen ska då vara dubbelt så hög som den dos som tidigare gavs varannan vecka.

Från 11 år: När önskad hemoglobinnivå uppnåtts med dosering varannan vecka kan Aranesp ges subkutant en gång per månad. Startdosen ska då vara dubbelt så hög som den dos som tidigare gavs varannan vecka.

Om hemoglobinnivån inte ökar tillräckligt kan dosen justeras med ungefär 25 %. Dosökning kan göras max en gång var fjärde vecka.

Viktigt att sänka dosen eller förlänga doseringsintervallet när Hb-värdet är normalt för att undvika överkorrigering.

Hållbarhet preparat:

Aranesp (registrerad produkt)

- Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Ljuskänsligt. När pennan har tagits ut ur kylskåpet och uppnått rumstemperatur (upp till 25 °C), måste den antingen användas inom 7 dagar eller kasseras.

- Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Ljuskänsligt. När sprutan har tagits ut ur kylskåpet och uppnått rumstemperatur (upp till 25 °C), måste den antingen användas inom 7 dagar eller kasseras.

Övrig information

Darbepoetin kan ges mer sällan än erythropoetin, men kan orsaka smärta vid injektionsstället (subkutant).

Det finns en teoretisk risk att utveckla neutraliserande antikroppar vid

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-15 08:50:30

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-15 16:25:09

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2885

ID/spårnummer: 3544

Giltig fr o m: 2017-08-15 16:25:09

Utskriftsdatum: 2017-08-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Darbepoetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp) förfylld penna resp spruta

behandling med Aranesp. Risken minimeras vid intravenös administrering.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2885

Substansspecifika uppgifter

darbepoetin alfa, B03XA02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POJNUCI2LVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-15 08:50:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-15 16:25:09
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2885
ID/spårnummer: 3544
Giltig fr o m: 2017-08-15 16:25:09
Utskriftsdatum: 2017-08-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

