



Darbeпоetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp)

Skaka inte lösningen, risk för inaktivering av substansen.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Förfylld injektionspenna 20, 40, 60, 80, 100, 150, 300 resp 500 mikrog
Förfylld injektionsspruta 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300 resp 500 mikrog

Observera att injektionspennan endast får administreras subkutan.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Innan administrering, låt pennan/sprutan ligga tills den uppnår rumstemperatur.

Skaka inte lösningen, risk för inaktivering av substansen.

Subkutan injektion:

Rekommenderas i första hand då det ger något bättre effekt. Lämpligt för de patienter som saknar central infart eftersom eventuell punktering av perifer ven undviks. Förfylld spruta eller penna kan användas.

Intravenös injektion:

Endast förfylld spruta ska användas, ej pennan. Ges under 1-3 min. Patientens dos kan spädas med ca 5 mL NaCl 9 mg/mL för att underlätta administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aranesp (registrerad produkt)

Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Ljuskänsligt. När pennan har tagits ut ur kylskåpet och uppnått rumstemperatur (upp till 25 °C), måste den antingen användas inom 7 dagar eller kasseras.

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Ljuskänsligt. När sprutan har tagits ut ur kylskåpet och uppnått rumstemperatur (upp till 25 °C), måste den antingen användas inom 7 dagar eller kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Renal anemi

Dialyspatienter:

Startdos: 0,45 mikrogram/kg var 7:e dag

Underhållsdos: Ges varje eller varannan vecka.

Övergång från dosering en gång i veckan till varannan vecka kräver initialt dubblerad dosering.

Övriga patienter:

Startdos: 0,45 mikrogram/kg var 7:e dag alternativt kan 0,75 mikrog/kg ges subkutan var 14:e dag.

När önskad hemoglobinnivå uppnåtts med dosering varannan vecka kan darbeпоetin alfa ges subkutan en gång per månad. Startdosen ska då vara dubbelt så hög som den dos som tidigare gavs varannan vecka.

Om hemoglobinnivån inte ökar tillräckligt kan dosen justeras med ungefär 25 %. Dosökning kan göras max en gång var fjärde vecka.

Viktigt att sänka dosen eller förlänga doseringsintervallet när Hb-värdet är normalt för att undvika överkorrigering.

ÖVRIG INFORMATION

Darbeпоetin alfa kan ges mer sällan än erythropoetin, men kan orsaka smärta vid injektionsstället (subkutan).

Det finns en teoretisk risk att utveckla neutraliserande antikroppar vid behandling med darbeпоetin alfa. Risken minimeras vid intravenös administrering.





Darbepoetin alfa intravenös, subkutan inj (Aranesp)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2885

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-11-11

ePedID: 2885

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-11-26

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-11-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT