

Octreotide/Sandostatin, SC inj
Oktreotid 50 mikrogram/ml

Beredningsinstruktion: Spädes ej.

Administrering: Laddningsdos vid blödande varicer ges sc av utspädd Octreotide/Sandostatin. Underhållsdosen ges som kontinuerlig infusion av spädd Octreotide/Sandostatin (se denna instruktion för mer info).

Hållbarhet efter iordningställande: 24 timmar kylskåp.; Originalförp hållbarhet: Förvaras i kylskåp (2-8°C). Får ej frysas. Ljuskänsligt, förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

Varunummer: 57455, Sandostatin inj 50mg/ml Nova, 5 x 1 ml

Källa: FASS

Indikation: Vid behov av minskad sekretion antingen vid stora tarmförluster eller vid blödningar från varicer hos leversjuk patient.

Vanlig dos: Laddningsdos vid blödande varicer:

Barn under 20 kg: 25 mikrogram subkutant

Barn över 20 kg: 50 mikrogram subkutant

Referens - Det blåa fältet innehåller klickbar länk till referensen

FASS via fass.se:

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produktpg?productId=200705080002&&DocTypeId=3&UserTypeId=0
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/substance_products.jsp?substanceid

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus: Blödande esofagusvaricer...

<http://eamlainuti.karolinska.se/upload/Barnstommedicin/GI/blodn.org.5.pdf>