



Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL

(ex Sandostatin)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd injektionslösning oktreotid 50 mikrog/mL.

Se till att lösningen har rumstemperatur innan administreringen för att minska risken för obehag vid injektionsstället.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Subkutan injektion

Subkutan infusion

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oktreotid (registrerad produkt)

50 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Kan förvaras 14 dagar i rumstemperatur. Kasseras efter första uttag. Gäller även 100 mikrog/mL.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Blödande esofagusvaricer eller annan akut GI-blödning - laddningsdos

Laddningsdos:

Barn under 20 kg: 25 mikrogram (0,5 mL) som subkutan injektion

Barn över 20 kg: 50 mikrogram (1 mL) som subkutan injektion

Efterföljande underhållsdos ges som kontinuerlig intravenös infusion med spädd lösning, se annan instruktion.

Hyperinsulinism

Kan ges antingen som injektion eller kontinuerlig infusion via insulinpump.

Nyfödda:

Injektion

2 - 5 mikrog/kg x 3 - 4

Kontinuerlig infusion

2 - 10 (-20) mikrog/kg/dygn vilket motsvarar 0,08 - 0,4 (- 0,8) mikrog/kg/tim.

Max 40 mikrog/kg/dygn motsvarande 1,67 mikrog/kg/tim.

Barn 1 mån - 18 år:

Injektion

5 mikrog/kg x 3 - 4, max 40 mikrog/kg per dygn

Kontinuerlig infusion

2 - 10 (-20) mikrog/kg/dygn vilket motsvarar 0,08 - 0,4 (- 0,8) mikrog/kg/tim.

Max 40 mikrog/kg/dygn motsvarande 1,67 mikrog/kg/tim.

RIMLIG DOS FÖR 50 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mikrog/kg	0,04 mL	0,2 mL	-	-
5 mikrog/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
0,4 mikrog/kg/tim	0,01 mL/tim	0,04 mL/tim	0,08 mL/tim	0,4 mL/tim



Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/product?8&userType=0&nplId=20070508000028&DocTypeID=3&UserTypeID=0>

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2890

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-04-18

ePedID: 2890

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-23

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT