



Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL

(ex Sandostatin)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd inj/infusionslösning oktreotid 50 mikrog/mL, behöver ej spädas.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Låt lösningen anta rumstemperatur innan administrering för att minska risken för obehag vid injektionsstället.

Subkutan injektion

Subkutan infusion

RIMLIG DOS FÖR 50 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mikrog/kg	0,04 mL	0,2 mL	-	-
5 mikrog/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
0,4 mikrog/kg/tim	0,01 mL/tim	0,04 mL/tim	0,08 mL/tim	0,4 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oktreotid (registrerad produkt)

50 mikrog/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Kan förvaras 14 dagar i rumstemperatur. Kasseras efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Blödande esofagusvaricer eller annan akut GI-blödning - laddningsdos

Laddningsdos:

Barn under 20 kg: 25 mikrogram (0,5 mL) som subkutan injektion

Barn över 20 kg: 50 mikrogram (1 mL) som subkutan injektion

Efterföljande underhållsdos ges som kontinuerlig intravenös infusion med spädd lösning, se annan instruktion.

Hyperinsulinism

Bör ordineras i samråd med endokrinspecialist.

Kan ges antingen som injektion eller som kontinuerlig infusion via insulinpump.

Nyfödda:

Injektion

2 - 5 mikrog/kg x 3 - 4

Kontinuerlig infusion

2 - 10 (-20) mikrog/kg/DYGN vilket motsvarar 0,08 - 0,4 (- 0,8) mikrog/kg/TIM.

Max 40 mikrog/kg/DYGN motsvarande 1,67 mikrog/kg/TIM.

Barn 1 mån - 18 år:

Injektion

5 mikrog/kg x 3 - 4, max 40 mikrog/kg per dygn

Kontinuerlig infusion

2 - 10 (-20) mikrog/kg/DYGN vilket motsvarar 0,08 - 0,4 (- 0,8) mikrog/kg/TIM.

Max 40 mikrog/kg/DYGN motsvarande 1,67 mikrog/kg/TIM.



Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin)



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2890

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-01-14

ePedID: 2890

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-01-22

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT