

Infliximab intravenös inf (Remicade), stamlösning för vidare spädning

OBS! Detta är spädningsinstruktionen till stamlösning. Den måste sedan spädas vidare med Natriumklorid enligt instruktion i favorit i journalsystemet till en total slutvolym på 250 ml.

| | | | | | |
|---------------------------|----------|---|----------------|---|-------------------|
| Stamlösning | Remicade | | Sterilt Vatten | | SKA SPÄDAS VIDARE |
| Ska spädas vidare: | 100 mg | + | | = | 10 mg/mL |
| | 1 st | | 10 mL | | 10 mL |

Beredningsinstruktion: Använd handskar vid beredning.

Steg 1: Tillför 10 ml sterilt vatten i varje ampull. Det ska vara vakuum i ampullen, men den sista vätskan kan man behöva trycka in i ampullen. Skaka ej flaskan utan rotera försiktigt. Låt lösningen stå ca 5 minuter.

Individuell spädning

Beredningsinstruktion: Steg 2: Använd 250 ml NaCl 9 mg/ml för infusionen. Dra ut den mängd NaCl som motsvarar den mängd Remicade som ska tillföras. Se ordinationshandling för den individuella dosen. Doser nedan är exempel.

Exempelvolym av Remicade 10 mg/mL

| Kroppsvikt | Volym vid dos 5 mg/kg | Volym vid dos 10 mg/kg |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 5 kg | 2,5 mL till 250 mL | 5 mL till 250 mL |
| 10 kg | 5 mL till 250 mL | 10 mL till 250 mL |
| 25 kg | 12,5 mL till 250 mL | 25 mL till 250 mL |
| 50 kg | 25 mL till 250 mL | 50 mL till 250 mL |

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., Risken för att framkalla allergiska reaktioner är ytterst liten då beredning sker enligt anvisningarna.

Administreringsätt

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-12-04 13:17:24
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-12-16 09:17:56
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2891
ID/spårnummer: 1017
Giltig fr o m: 2015-12-16 09:17:56
Utskriftsdatum: 2015-12-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Infliximab intravenös inf (Remicade), stamlösning för vidare spädning

Intravenös infusion: Barn: Använd infusionsaggregat med Mirafilter (Baxter eller Alaris, Medical System).
Infusionstakten är till en början minst 2 timmar.
Efter 4 problemfria infusioner givet under 2 timmar kan infusionstiden minskas till 1 timme (250 ml/h) från och med infusion nr 5.
Patienten ska efter avslutad infusion stanna kvar för observation under 60 min efter de fem första infusionerna.
Efter infusion nr 6 kan patienten gå hem direkt efter avslutad infusion.

Före infusionen kontrolleras patientens puls, blodtryck, vikt, längd och temp.
Blodtryck och puls ska sedan kontrolleras var 30:e minut under infusionen.

Vanlig indikation och dos

Behandling av svår Crohns sjukdom och svår ulcerös kolit hos barn mellan 6 och 17 år.

Induktion vecka 0, 2 resp 6:
5 mg/kg ges som intravenös infusion under 2 timmar.
Därefter ges behandling var 8:e vecka. Dosintervallet kan ändras över tid till 4-12 veckors intervall. Dosen kan vid utebliven effekt ökas till 10 mg/kg.

Rescuebehandling: 5 mg/kg som singeldos.

Efter behandlingsuppehåll med Remicade ska återupptagen behandling ges var 8:e vecka utan induktionsdoser.

Juvenil idiopatisk artrit.

6 mg/kg givet som intravenös infusion under 2 timmar vecka 0, 2, 6 och därefter var 8:e vecka. (BLF Reumatologi)

Hållbarhet preparat:

Remicade (Registrerad Produkt)
10 mg/mL, Stamlösning
Hållbar: Får ej sparas pga förväxlingsrisk

Övrig information

Mer info om profylaxbehandling samt kontroller inför infusion finns i länken "Praktisk hantering...".

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Praktisk hantering vid behandling av IBD med infliximab (Remicade), Hämtat: 2014-03-04

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-12-04 13:17:24
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-12-16 09:17:56
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2891
ID/spårnummer: 1017
Giltig fr o m: 2015-12-16 09:17:56
Utskriftsdatum: 2015-12-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Infliximab intravenös inf (Remicade), stamlösning för vidare spädning

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID67516C6267608201C1257A9F003D8574?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2015-12-15

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Farmakologiska behandlingsrutiner för juvenil idiopatisk artrit, JIA,
Hämtat: 2014-11-17

<http://www.blf.net/reumatologi/vardprogram/FarmBeh.pdf>

Substansspecifika uppgifter

Infliximab, L04AB02

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-12-04 13:17:24
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-12-16 09:17:56
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2891
ID/spårnummer: 1017
Giltig fr o m: 2015-12-16 09:17:56
Utskriftsdatum: 2015-12-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

