



# Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL

(ex Toradol)

**Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.**

**Ökad blödningsbenägenhet, se Övrig information.**

## EN-STEGSSPÄDNING

Ketorolak 30 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL	=	INJ LÖ <b>3 mg/mL</b> 10 mL
-------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

## ADMINISTRERING

Intravenös injektion: Ska administreras långsamt, under minst 10 min, för att minimera risk för biverkningar.

## RIMLIG DOS för Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,3 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Ketorolak (registrerad produkt)

30 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i ytterkartongen, ljuskänsligt.

3 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Akut moderat till svår smärta (ex gallsten)

Barn 3 mån - 15 år: 0,3 (- 0,5) mg/kg x 3 - 4

Barn 16 - 18 år: 0,3 (- 0,5) mg/kg x 4 - 6

Maxdos barn under 50 kg: 15 mg/DOS, 60 mg/DYGN

Maxdos barn från 50 kg: 30 mg/DOS, 90 mg/DYGN

Kan initialt ges varannan timme postoperativt.

Behandling bör ej pågå mer än 2 dygn.

## ÖVRIG INFORMATION

Ketorolak är ett NSAID-preparat och det finns risk för allvarliga gastrointestinala biverkningar och njurfunktionsnedsättning, särskilt vid behandling längre än 2 dagar.

Inför procedurer (som t.ex. LP) ska ketorolak ges senast 24 timmar innan, detta pga ökad blödningsbenägenhet.

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress VGR, Alfresco - Smärtbehandling av barn och ungdomar

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/22682?/a=false&guest=true>

PubMed PMID Breivik H et al. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Jan;54(1)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19839941>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



# Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL

(ex Toradol)



---

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2898](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2898)

---

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 2898

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-03-22

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**