



Uppvätskning: Underhåll 24 h, enteralt i sond

ADMINISTRERINGSSÄTT

Enteralt i sond: Doserna är beräknade utifrån 24 timmar, men faktisk administrationstid beror på patientens tillstånd.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Sonduppvätskning vid dehydrering hos barn med infektiös gastroenterit

Barn under 6 månader uppvätskas med bröstmjolk/bröstmjölksersättning.

Barn över 6 månader uppvätskas med majsvälling alternativt allergivänligt alternativ.

Kan vid behov blandas med vätskeersättning.

Mängd vätska per 24 timmar beräknas utifrån kroppsvikt:

0 - 6 kg: 150 mL/kg

7 - 20 kg: 6 x 150 mL + 50 mL/kg för varje kg över 6 kg

Över 20 kg: 6 x 150 mL + 14 x 50 mL + 20 mL/kg för varje kg över 20 kg

0 - 6 kg: 150 mL/kg

7 - 20 kg: 900 mL + 50 mL/kg över 6 kg

Över 20 kg: 900 mL + 700 mL + 20 mL/kg över 20 kg

Utöver detta lägg till 10 mL/kg för varje diarré.

Uträkningsexempel:

Vikt 12 kg: 6 x 150 mL (=900) + 6 x 50 mL = 1200 mL/24h

Vikt 23 kg: 6 x 150 mL (=900) + 14 x 50 mL (=700) + 3 x 20 mL = 1660 mL/24 h

REFERENS/LÄNK

Rekommendation (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2899

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-10-23

ePedID: 2899

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-30

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-10-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT