

Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral), kapsel

Denna instruktion gäller för kapsel 10, 25, 50 och 100 mg.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringsätt

Oralt: Doserar två gånger dagligen, med så jämnt 12 timmars intervall som möjligt.

Vanlig indikation och dos**Transplantationsreaktion, profylax**

Barn över 6 mån:

Initialt 15 mg/kg 4 - 12 tim innan organtransplantation.

Därefter 3 - 7,5 mg/kg x 2

Terapiresistent nefrotiskt syndrom

Barn: 3 mg/kg x 2

Refraktär ulcerös colit

Barn 2 - 17 år:

Initialt 2 mg/kg x 2, max 5 mg/kg x 2.

Ingen förbättring efter 1 månad: ökad gradvis dosen till maxdos.

Avbryt behandling om otillräckligt svar efter 3 månader

Övrig information

Viktigt att följa ciklosporin-blodkoncentration, lever- och njurfunktion och utifrån det monitorera dosen regelbundet (var 4 - 7 dag). För transplanterade patienter bör kalium och uratnivåer följas.

Ciklosporin interagerar med flera andra läkemedel som påverkar CYP3A4 och p-gp-protein, vilket kan påverka ciklosporinkoncentrationen i plasma.

Kapslarna är fuktkänsliga och ska därför förvaras i tryckförpackningen tills de intas. Kapslarna kan lukta speciellt, vilket är normalt.

För administrering via sond, använd ciklosporin oral lösning.

100 mg Sandimmun Neoral innehåller 100 mg etanol, motsvarande ca 3 mL öl

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-09-13 16:27:11

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 11:07:41

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2902

ID/spårnummer: 1555

Giltig fr o m: 2016-09-28 11:07:41

Utskriftsdatum: 2016-10-06

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral), kapsel

eller 1 mL vin.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-09-13

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2016-09-13

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax , Hämtat: 2016-09-13

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2016-09-13

Rekommendation ,(Grade 2A), Hämtat: 2016-09-28

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Ciklosporin, L04AD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POF8UASJQVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-09-13 16:27:11

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-28 11:07:41

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2902

ID/spårnummer: 1555

Giltig fr o m: 2016-09-28 11:07:41

Utskriftsdatum: 2016-10-06

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

