

Ciklosporin oralt

(ex Sandimmun Neoral), kapsel

Denna instruktion gäller för kapsel 10, 25, 50 och 100 mg.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

Administreringsätt

Oralt: Doserar två gånger dagligen, med så jämnt 12 timmars intervall som möjligt.

Vanlig indikation och dos**Transplantationsreaktion, profylax**

Barn över 6 mån:

Initialt 15 mg/kg 4 - 12 tim innan organtransplantation.

Därefter 3 - 7,5 mg/kg x 2

Terapieresistent nefrotiskt syndrom

Barn: 3 mg/kg x 2

Refraktär ulcerös colit

Barn 2 - 17 år:

Initialt 2 mg/kg x 2, max 5 mg/kg x 2.

Ingen förbättring efter 1 månad: ökad gradvis dosen till maxdos.

Avbryt behandling om otillräckligt svar efter 3 månader

Övrig information

Viktigt att följa ciklosporin-blodkoncentration, lever- och njurfunktion och utifrån det monitorera dosen regelbundet (var 4 - 7 dag). För transplanterade patienter bör kalium och uratnivåer följas.

Byte mellan olika tillverkare eller formuleringar bör inte ske under behandling av en patient. Om byte sker, följ blodkoncentration och monitorera eventuellt dos.

För administrering via sond, använd ciklosporin oral lösning.

Ciklosporin interagerar med flera andra läkemedel som påverkar CYP3A4 och pgp-protein, vilket kan påverka ciklosporinkoncentrationen i plasma.

Kapslarna är fuktkänsliga och ska därför förvaras i tryckförpackningen tills de

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-10-11 14:13:47

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-11 14:13:39

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2902

ID/spårnummer: 1603

Giltig fr o m: 2016-10-11 14:13:39

Utskriftsdatum: 2016-10-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral), kapsel

intas. Kapslarna kan lukta speciellt, vilket är normalt.

Kapslarna innehåller etanol. Kapsel med styrkan 100 mg (Sandimmun Neoral) innehåller 100 mg etanol, motsvarande ca 3 mL öl eller 1 mL vin. Ciklosporin IVAX innehåller 1,5 gånger mer etanol.

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2016-09-13

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfclegacy/current/>

FASS , Hämtat: 2016-09-13

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax , Hämtat: 2016-09-13

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2016-09-13

Rekommendation ,(Grade 2A), Hämtat: 2016-09-28

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Substansspecifika uppgifter

Ciklosporin, L04AD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POF8UASIQVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-10-11 14:13:47

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-10-11 14:13:39

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2902

ID/spårnummer: 1603

Giltig fr o m: 2016-10-11 14:13:39

Utskriftsdatum: 2016-10-11

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

