



Hydroxizin oralt 2 mg/mL

(Atarax) oral lösning

Hög risk för biverkningar, se Övrig information

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hydroxizin (ex Atarax) (registrerad produkt)

2 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur. Ljuskänsligt. Bruten förpackning: Hållbar 6 månader.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas. Rekommenderas endast i undantagsfall.

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Ångest och oro (off label)

Barn 5 - 18 år: 10 - 25 mg x 3 (5 - 12,5 mL)

Maxdos

Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN

Barn över 40 kg: 100 mg/DYGN

Sömnstörning (off label)

Barn 5 - 11 år: 10 - 25 mg x 1, till kvällen (5 - 12,5 mL)

Barn 12 - 18 år: 25 - 50 mg x 1, till kvällen (12,5 - 25 mL)

Maxdos

Barn under 40 kg: 2 mg/kg/DYGN

Barn över 40 kg: 100 mg/DYGN





Hydroxizin oralt 2 mg/mL

(Atarax) oral lösning

ÖVRIG INFORMATION

Hydroxizin är en H1-receptorantagonist och har en central verkan på formatio reticularis, vilket påverkar bl.a. medvetande och vakenhet. Hydroxizin har också en antikolinerg, spasmolytisk och adrenolytisk verkan. Yngre barn är mer benägna att få biverkningar relaterade till centrala nervsystemet jämfört med vuxna. Krampfall har rapporterats mer frekvent för barn än för vuxna.

Risk för hangover-effekt, kvarstående sedering och förlängd QT-tid.

Samtidig användning av hydroxizin och alkohol ska undvikas eftersom kombinationen kan förstärka effekterna av hydroxizin.

Vid doser högre än 13 mg (6,5 mL) bör innehållet av sackaros beaktas för patienter med diabetes mellitus. Sackaros kan även ge skador på tänderna.

För hydroxizin finns godkänd indikation urtikaria och klåda för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för hydroxizin. Därför finns inte indikationen urtikaria och klåda med på denna barnläkemedelsinstruktion.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

<https://lv.se/neuroleptikatillbarn>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn

<https://lv.se/somnstorningarhosbarn>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-06-05

ePedID: 2911

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-06-05

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-06-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT