

Bromhexin oralt 8 mg (Bisolvon)

Bromhexine

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Slemlösande

Barn över 12 år: 1 tablett x 3

Slemlösande vid Cystisk Fibros

Barn under 40 kg: 1 tablett x 3

Barn över 40 kg: 2 tabletter x 3

Övrig information

Försiktighet med Bisolvon vid ulcus och vid större hemoptys.

Bromhexin omvandlas till ambroxol i kroppen. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin med anledning av ökat antal rapporter om allergiska reaktioner.

Referens/Länk

FASS Bromhexin, Hämtat: 2015-05-28

<http://www.fass.se/LIF/product?10&userType=2&nplid=19730831000099&docType=3>

Personlig kontakt Ferenc Karpati, Hämtat: 2015-05-28

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-10-23

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade

Internetadress Granskning av ambroxol och bromhexin inleds, Hämtat: 2015-10-22

<https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2014/Granskning-av-ambroxol-och-bromhexin-inleds/>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-10-22 08:52:37

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-23 11:45:08

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2933

ID/spårnummer: 908

Giltig fr o m: 2015-10-23 11:45:08

Utskriftsdatum: 2015-10-23

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

