



# Amikacin inhalation 250 mg/mL

(Biklin)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalation av injektionsvätska 250 mg/mL (Biklin)

## ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Inhalation:

Patientens dos (2 mL) blandas med 2 - 3 mL NaCl 9 mg/mL i nebulisatorn. Inhaleras med hjälp av eFlow eller motsvarande utrustning. Utandningsfilter ska användas.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Biklin (från registrerad produkt)

250 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Efter första uttag hållbar 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska ordineras av cystisk fibros-läkare.

### Luftvägsinfektion med *Mycobacterium abscessus* vid cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 500 mg x 1 - 2 (2 mL x 1 - 2)

Inhaleras efter sedvanlig inhalationsbehandling och andningsgymnastik.

Patientens förmåga att ha rätt inhalationsteknik styr vid vilken ålder som behandlingen kan sättas in.

## ÖVRIG INFORMATION

Serumkoncentrationen av amikacin bör kontrolleras hos patienter med känd eller misstänkt hörsel- eller njurfunktionsnedsättning samt hos patienter som samtidigt får parenteral behandling med aminoglykosid.

## REFERENS/LÄNK

PubMed PMID Lamb GS et al. *Mycobacterium abscessus* infections in children: a review of current literature.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29897511>

Summary of Product Characteristics (SPC) Biklin injektionsvätska 250 mg/mL

<https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=19791019000010&type=product>

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-02-14

ePedID: 2934

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-02-19

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-02-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**