



Acetylcystein intravenös inf 18 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Acetylcystein		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50	INF
200 mg/mL	+	mg/mL	= 18 mg/mL
10 mL		100 mL	110 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Ges under 20 min med start 30 min före andningsgymnastik.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Acetylcystein (registrerad produkt)

200 mg/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt.

18 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Slemlösande vid cystisk fibros (låg evidens)

Kan ges innan andningsgymnastik då peroral slemlösande behandling inte har tillräcklig effekt.

Barn 10 - 18 år: 110 mL x 1 - 2

ÖVRIG INFORMATION

Intravenös behandling med slemlösande läkemedel bör undvikas till barn under 6 mån samt till nydiagnostiserade patienter. Invänta och utvärdera först effekten av peroral behandling då alltför löst slem kan vara svårt för patienten att hantera.

REFERENS/LÄNK

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2938

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-09-23

ePedID: 2938

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-06

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT