

Kåvepenin 50 mg/mL oral suspension (från dospåse eller färdigblandad)

Phenoxymethylpenicillin

Flera styrkor finns, kontrollera att du använder rätt instruktion.

En-stegsspädning:	Kåvepenin		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
	250 mg	+		=	50 mg/mL
	1 st		3 mL		5 mL

Beredningsinstruktion

Denna spädninginstruktion skiljer sig från den på dospåsarnas bipacksedel. Om hela dospåsen ska ges, späd med 10 - 20 ml vatten. Om delmängd av dospåsen ska ges späd enligt ovan för att veta koncentrationen. Pulvrets volym motsvarar 2 ml.

Använd i första hand färdigblandad Kåvepenin Frukt 50 mg/mL från Apoteket.

Hållbarhet preparat:

Kåvepenin (Registrerad Produkt)

- 50 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Egenblandad lösning från dospåse ska användas omedelbart efter beredning. Resterande lösning får ej sparas.

Kåvepenin Frukt (Registrerad Produkt)

- 50 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Beställs färdigberedd från Apoteket och förvaras i kyl max 14 dygn.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Skakas väl innan användning.

Oralt

Enteralt i sond: Går att ge i sond

Vanlig indikation och dos

Akut otitis media

25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 6 g/dygn)

Vid recidiv behandling i 10 dygn (max 6 g/dygn)

Pneumoni

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-04-20 14:57:23

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-04-21 15:48:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2943

ID/spårnummer: 656

Giltig fr o m: 2015-04-21 15:48:20

Utskriftsdatum: 2015-04-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Kåvepenin 50 mg/mL oral suspension (från dospåse eller färdigblandad)

Phenoxymethylpenicillin

Flera styrkor finns, kontrollera att du använder rätt instruktion.

Barn under 5 år: 25 mg/kg x 3 i 5 - 7 dygn (max 6 g/dygn)

Barn över 5 år: 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 6 g/dygn)

Akut sinuit

25 mg/kg x 3 i 7 - 10 dygn (max 6 g/dygn)

Faryngotonsillit

12,5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 3 g/dygn)

Tandabscess

25 mg/kg x 3 i 7-10 dygn (max 6 g/dygn)

Borrelia Erytema Migrans

25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 3 g/dygn)

Penicillinprovokation

25 mg/kg som engångsdos i infektionsfritt intervall eller i samband med behandlingskrävande infektion.

Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg/dos	0,25 mL	1,2 mL	2,5 mL	12,5 mL
25 mg/kg/dos	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL

Övrig information

Absorberas till ca 50%, samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad. Observera att det är stor variation i absorptionsgrad för prematurer.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-02-27

<http://www.fass.se/LIF/substance76&userType=0&substancelid=>

Internetadress Barnallergisektionen Handläggning av misstänkta överkänslighetsreaktioner mot beta-laktam antibiotika, Hämtat: 2014-07-30

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D14_antibiotika.pdf

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2013-11-12

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Rekommendation Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård., Hämtat: 2014-08-21

<http://www.lakemedelsverket.se//Alla-nyheter/Nyheter-2013/Uppdaterad-broschyr-om-behandling-av-vanliga-infektioner/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-04-20 14:57:23

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-04-21 15:48:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2943

ID/spårnummer: 656

Giltig fr o m: 2015-04-21 15:48:20

Utskriftsdatum: 2015-04-21

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

