

Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (Kåvepenin) från dospåse eller färdigblandad

Stor risk för förväxling, flera styrkor kan finnas.

Instruktionen gäller för: Alt. 1: Färdigblandad oral suspension Kåvepenin Frukt 50 mg/mL
Alt 2: Spädning från granulat i dospåse 250 mg

En-stegsspädning:	Kåvepenin		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
Alt 2	250 mg	+		=	50 mg/mL
	1 st		3 mL		5 mL

Beredningsinstruktion: Denna spädningsinstruktion skiljer sig från den i dospåsarnas bipacksedel. Om hela dospåsen ska ges, späd med 10 - 20 mL vatten. Om delmängd av dospåsen ska ges späd enligt ovan för att veta koncentrationen. Pulvrets volym motsvarar 2 mL.

Arbetsmiljö Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Skakas väl innan användning.

Oralt

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Akut otitis media (AOM)

Vid säker AOM hos barn 1 - 12 år: aktiv expektans

Vid säker AOM hos barn under 1 år eller över 12 år: antibiotikabehandling

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 5 dygn, vid recidiv inom 4 veckor: 10 dygn

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-22 10:13:43
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 10:44:09
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2943
ID/spårnummer: 3582
Giltig fr o m: 2017-08-23 10:44:09
Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (Kåvepenin) från dospåse eller färdigblandad

Pneumoni

Barn under 5 år, alternativt amoxicillin:
25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 5 - 7 dygn

Barn över 5 år:
25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 7 dygn

Akut sinuit

Expektans rekommenderas vid symtom färre än 10 dygn vid förkylning med purulent snuva och måttlig smärta över bihålorna.

Barn 0 - 18 år:
25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 7 - 10 dygn

Akut streptokocktonsillit

Barn 0 - 18 år: 12,5 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

Tandabscess

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 6 g/dygn

Behandlingstid: 5 - 7 (- 10) dygn

Borrelia med solitärt erytema migrans

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

Kattbett

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-22 10:13:43
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 10:44:09
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2943
ID/spårnummer: 3582
Giltig fr o m: 2017-08-23 10:44:09
Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL

(Kåvepenin) från dospåse eller färdigblandad

Erysipelas (rosfeber)

Barn 0 - 18 år:

25 mg/kg x 3, max 1 g x 3. Kan vid behov ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 10 - 14 dygn

Penicillinprovokation

Engångdos 25 mg/kg i infektionsfritt intervall eller i samband med behandlingskrävande infektion.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL
25 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
max 1 g				20 mL

Hållbarhet preparat:

Kåvepenin (registrerad produkt)

- 50 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Egenblandad lösning från dospåse ska användas omedelbart efter beredning. Resterande lösning får ej sparas.

- 50 mg/mL, Granulat till oral suspension

Hållbar: Beställs färdigberedd från apoteket och kan förvaras i kylskåp i max 14 dagar.

Övrig information

Absorberas till ca 50%, samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad. Observera att det är stor variation i absorptionsgrad för prematurer.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/infektioner/>

Internetadress Läkemedelsverket, Antibiotikabehandling i tandvården

<https://lv.se/antibiotikabehandling-tandvard>

Internetadress Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendation Borrelia

<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Borrelia/>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-22 10:13:43

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 10:44:09

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 2943

ID/spårnummer: 3582

Giltig fr o m: 2017-08-23 10:44:09

Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (Kåvepenin) från dospåse eller färdigblandad

Internetadress Strama Stockholm

<http://www.janusinfo.se/Behandling/Strama-Stockholm/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Phenoxymethylpenicillin, J01CE02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POBZU95UFVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-22 10:13:43
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 10:44:09
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2943
ID/spårnummer: 3582
Giltig fr o m: 2017-08-23 10:44:09
Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

