

Adrenalin 1 mg/mL - INH

Epinephrine

Detta blad innehåller flera instruktioner beroende på inhalationsutrustning samt barnets ålder och vikt.

Ordinera dos i mL av Adrenalin 1 mg/mL.
För Aeroneb och Aiolos: Tillsätt sedan NaCl 9 mg/ml till totalt 2 ml.

Hållbarhet preparat:

Adrenalin Mylan (Registrerad Produkt)

● 1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Förvaras vid 2-8 C (i kylskåp).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Administreringssätt

Inhalation:

AERONEB: Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,1 ml.

AIOLOS: Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,5 ml.

MAXIN: Inhalera i antal minuter enligt ordination. Inhalera i 1:a hand via munstycke, i övriga fall flöda med mask (eller slang) 1 cm från näsa och mun. Om patienten flödar med slang 1 cm från munnen så är det att likställa med inhalation via mask (enl lungspecialister på ALB/Sachsska).

MAXIN+OPTIFLOW: Inhaleras enligt samma tid som enbart Maxin. Data saknas hur upptaget skiljer sig från övriga inhalationsmetoder. Glesa ut antal doseringstillfällen om patienten får för hög puls (enl lungspecialister på ALB/Sachsska).

Vanlig indikation och dos

Nyfödda inom neonatalverksamhet. Via AERONEB.

0,2 ml Adrenalin 1 mg/ml + 1,8 ml NaCl 9 mg/ml.

Under 2 år. Via AIOLOS.

0,5 ml Adrenalin 1 mg/ml + 1,5 ml NaCl 9 mg/ml

Över 2 år. Via AIOLOS.

1 ml Adrenalin 1 mg/ml + 1 ml NaCl 9 mg/ml

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-05-25 14:18:31

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-05-25 13:36:12

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2953

ID/spårnummer: 708

Giltig fr o m: 2015-05-25 14:18:31

Utskriftsdatum: 2015-05-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Adrenalin 1 mg/mL - INH

Epinephrine

Detta blad innehåller flera instruktioner beroende på inhalationsutrustning samt barnets ålder och vikt.

Under 20 kg. Via MAXIN.

Barn som väger under 20 kg och använder munstycke ska inhalera 1 minut med Adrenalin 1 mg/ml.

Över 20 kg. Via MAXIN.

Alla barn som använder mask + de barn som väger över 20 kg och använder munstycke ska inhalera 2 minuter med Adrenalin 1 mg/ml.

Övrig information

Om patienten får för hög puls, behåll inhalationstiderna men glesa ut antalet doseringstillfällen.

För nyfödda som erhåller 0,2 ml adrenalin 1 mg/ml + 1,8 ml NaCl 9 mg/ml ger det en lösning på 0,1 mg/ml. Denna blandning kan ersättas med färdigblandad Adrenalin Martindale 0,1 mg/ml. Få studier finns som stödjer lämplig dos till nyfödda (Grade 2C).

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gemensamt PM för Stockholms barnsjukhus: Akut astma, Hämtat: 2012-10-22

<http://lis01.sil.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID3D49C4F6FB883AEC1257A29003F583C>

Personlig kontakt Per Thunqvist, Anders Lindfors, Hämtat: 2013-12-19

Rekommendation ,(Grade 1B), Hämtat: 2015-05-25

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-05-25

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-05-25 14:18:31

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-05-25 13:36:12

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2953

ID/spårnummer: 708

Giltig fr o m: 2015-05-25 14:18:31

Utskriftsdatum: 2015-05-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

