

Teofyllamin IV, inj lösning 23 mg/mL

Theophylline

OBS! EKG-övervakning krävs vid central intravenös tillförsel av Teofyllamin

Ges outspädd

Hållbarhet preparat:

Teofyllamin (Registrerad Produkt)

● 23 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Ljuskänsligt

Administreringsätt

Dosen ska ges långsamt intravenöst i perifer ven under ca 20 - 30 min för att minimera risken för biverkningar.

Vanlig indikation och dos

Anafylaxi, anafylaktisk reaktion. Ges vid fortsatt bronkospasm/astma trots inhalationsbehandling.

Barn under 1 år: 0,15 ml/kg

Barn över 1 år: 0,30 ml/kg

Dosen ska halveras till patienter som står på peroral teofyllinterapi.

Övrig information

Dosen 0,15 ml/kg motsvarar en dos om ca 3 mg teofyllin/kg kroppsvikt.

Dosera utifrån ideal kroppsvikt.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gemensamt PM för Stockholms barnsjukhus: Anafylaxi, Hämtat: 2015-08-21

<http://lis01.sil.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID69F8C0878C5BE155C1257A1C003CA188?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-08-25

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-08-21 09:21:12

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-08-26 09:32:04

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2962

ID/spårnummer: 794

Giltig fr o m: 2015-08-26 09:32:04

Utskriftsdatum: 2015-08-26

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

