



Prednisolon intravenös IV inj 25 mg/mL

(ex Precortalon aquosum)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Precortalon aquosum 25 mg/mL samt Prednisolon Ebb 25 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Prednisolon natriumsuccinat	Sterilt Vatten			INJ
25 mg		+		= 25 mg/mL
1 st	1 mL			1 mL

Beredningsinstruktion:

Snurra försiktigt tills lösningen är klar.

Den ordinerade dosen kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL för att ges som intravenös infusion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion

RIMLIG DOS för Prednisolon intravenös IV inj 25 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	-	0,1 mL	0,2 mL	1 mL
2 mg/kg	-	0,4 mL	0,8 mL	4 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prednisolon natriumsuccinat (registrerad produkt)

25 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Används omedelbart efter iordningställande. Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inflammatorisk tarmsjukdom

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 2 mg/kg x 1 (motsv. 0,67 - 2,68 mg/kg prednisolon).

Max 40 (- 60) mg/dygn (motsv. max 54 (- 80) mg/dygn prednisolon).

Vid högdos kan dygnsdosen delas upp i två dostillfällen. Max behandlingstid är 6 veckor.

Nedtrappningsschema:

- Vid högdosbehandling ska dosen sänkas med 10 mg/vecka.

- Vid en dygnsdos under 20 mg/dygn ska dosen sänkas med 5 mg/vecka.

ÖVRIG INFORMATION

Precortalon aquosum och Prednisolon Ebb innehåller prednisolon natriumsuccinat.

Dosen måste justeras upp med konverteringsfaktorn 1,34 eftersom styrkan på produkterna avser prednisolon natriumsuccinat och inte prednisolon.

Dos i prednisolon = 1,34 x dos prednisolon natriumsuccinat.

Läkemedel innehållande prednisolon natriumsuccinat är dyra, andra kostnadseffektiva kortikosteroider finns som alternativ.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ALL TOGETHER

A Treatment study protocol of the ALL Together Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



Prednisolon intravenös IV inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2019-12-02

ePedID: 2965

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-05

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT