



Prednisolon intravenös inj 25 mg/mL

(ex Precortalon aquosum)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Precortalon aquosum samt Prednisolon Ebb 25 mg/mL innehåller prednisolon natriumsuccinat (se under övrigt).

EN-STEGSSPÄDNING

Prednisolon natriumsuccinat	Sterilt Vatten			INJ
25 mg		+		= 25 mg/mL
1 st	1 mL			1 mL

Beredningsinstruktion:

Snurra försiktigt tills lösningen är klar.

Den ordinerade dosen kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL för att ges som intravenös infusion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion

RIMLIG DOS för Prednisolon intravenös inj 25 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	-	0,1 mL	0,2 mL	1 mL
2 mg/kg	-	0,4 mL	0,8 mL	4 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prednisolon natriumsuccinat (registrerad produkt)

25 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Används omedelbart efter iordningställande.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inflammatorisk tarmsjukdom

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 2 mg/kg x 1 (motsv. 0,67 - 2,68 mg/kg prednisolon).

Max 40 (- 60) mg/dygn (motsv. max 54 (- 80) mg/dygn prednisolon).

Vid högdos kan dygnsdosen delas upp i två dostillfällen. Max behandlingstid är 6 veckor.

Nedtrappningsschema:

- Vid högdosbehandling ska dygnsdosen sänkas med 10 mg/vecka.

- Vid en dygnsdos under 20 mg/dygn ska dygnsdosen sänkas med 5 mg/vecka.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Ordineras som del i trippelbehandling via ordinationsstöd för cytostatika, se enskilt protokoll.

ÖVRIG INFORMATION

Precortalon aquosum och Prednisolon Ebb innehåller prednisolon natriumsuccinat.

Dosen måste justeras upp med konverteringsfaktorn 1,34 eftersom styrkan på produkterna avser prednisolon natriumsuccinat och inte prednisolon.

Dos i prednisolon = 1,34 x dos prednisolon natriumsuccinat.

Läkemedel innehållande prednisolon natriumsuccinat är dyra, andra kostnadseffektiva kortikosteroider finns som alternativ.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NOPHO protokoll ALL TOGETHER

A Treatment study protocol of the ALL Together Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

<http://www.nopho.org/>

Rekommendation (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/varprogram/>



Prednisolon intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2019-12-17

ePedID: 2965

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-17

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT