



Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

(ex Precortalon aquosum)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Precortalon aquosum samt Prednisolon Ebb innehåller prednisolonnatriumsuccinat 25 mg/ml = prednisolon 18,65 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Prednisolon natriumsuccinat	Sterilt Vatten			INJ
25 mg		+		= 25 mg/mL
1 st	1 mL			1 mL

Beredningsinstruktion:

Snurra försiktigt tills lösningen är klar.

Den ordinerade dosen kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL för att ges som intravenös infusion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion

IntraTEKAL injektion

RIMLIG DOS för Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,67 mg/kg	-	0,13 mL	0,27 mL	1,34 mL
2,68 mg/kg	-	0,54 mL	1,07 mL	5,36 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prednisolon natriumsuccinat (registrerad produkt)

25 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Används omedelbart efter iordningställande.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inflammatorisk tarmsjukdom

Dosen måste justeras upp med konverteringsfaktorn 1,34 eftersom styrkan på produkterna avser prednisolonnatriumsuccinat och inte prednisolon.

Dos i prednisolonnatriumsuccinat = 1,34 x dos prednisolon.

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 2 mg/kg x 1 prednisolon (motsv. 0,67 - 2,68 mg/kg prednisolonnatriumsuccinat).

Max 40 (- 60) mg/dygn prednisolon (motsv. max 54 (- 80) mg/dygn prednisolonnatriumsuccinat).

Vid högdos kan dygnsdosen delas upp i två dostillfällen. Max behandlingstid är 6 veckor.

Nedtrappningsschema:

- Vid högdosbehandling ska dygnsdosen sänkas med 10 mg/vecka.

- Vid en dygnsdos under 20 mg/dygn ska dygnsdosen sänkas med 5 mg/vecka.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Ordineras som del i trippelbehandling via ordinationsstöd för cytostatika, se enskilt protokoll.

ÖVRIG INFORMATION

Läkemedel innehållande prednisolonnatriumsuccinat är dyra, andra kostnadseffektiva kortikosteroider finns som alternativ.





Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

(ex Precortalon aquosum)

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NOPHO protokoll ALL TOGETHER

A Treatment study protocol of the ALL Together Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

<http://www.nopho.org/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-04-15

ePedID: 2965

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-04-15

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT