



Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

(ex Precortalon aquosum)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Precortalon aquosum samt Prednisolon Ebb innehåller prednisolonnatriumsuccinat 25 mg/ml = prednisolon 18,65 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Prednisolon natriumsuccinat	Sterilt Vatten			INJ
25 mg		+		= 25 mg/mL
1 st	1 mL			1 mL

Beredningsinstruktion:

Snurra försiktigt tills lösningen är klar.

Den ordinerade dosen kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL för att ges som intravenös infusion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion

IntraTEKAL injektion

RIMLIG DOS för Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,67 mg/kg	-	0,13 mL	0,27 mL	1,34 mL
2,68 mg/kg	-	0,54 mL	1,07 mL	5,36 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prednisolon natriumsuccinat (registrerad produkt)

25 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Används omedelbart efter iordningställande.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inflammatorisk tarmsjukdom

Dosen måste justeras upp med konverteringsfaktorn 1,34 eftersom styrkan på produkterna avser prednisolonnatriumsuccinat och inte prednisolon.

Dos i prednisolonnatriumsuccinat = 1,34 x dos prednisolon.

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 2 mg/kg x 1 prednisolon (motsv. 0,67 - 2,68 mg/kg prednisolonnatriumsuccinat).

Max 40 (- 60) mg/dygn prednisolon (motsv. max 54 (- 80) mg/dygn prednisolonnatriumsuccinat).

Vid högdos kan dygnsdosen delas upp i två dostillfällen. Max behandlingstid är 6 veckor.

Nedtrappningsschema:

- Vid högdosbehandling ska dygnsdosen sänkas med 10 mg/vecka.

- Vid en dygnsdos under 20 mg/dygn ska dygnsdosen sänkas med 5 mg/vecka.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Ordineras som del i trippelbehandling via ordinationsstöd för cytostatika, se enskilt protokoll.

ÖVRIG INFORMATION

Läkemedel innehållande prednisolonnatriumsuccinat är dyra, andra kostnadseffektiva kortikosteroider finns som alternativ.

Tänk på att ta hänsyn till konverteringsfaktorn (1,34) vid övergång från intravenös till oral behandling.





Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

(ex Precortalon aquosum)

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NOPHO protokoll ALL TOGETHER

A Treatment study protocol of the ALL Together Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

<http://www.nopho.org/>

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-06-03

ePedID: 2965

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-09

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-06-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT