

Natriumklorid, INH
9 mg/ml

Administrering: För inhalation i antingen Maxin eller Aiolos.

Varunummer: 60678, Natr-klor inj 9mg/ml Brau Mini, 20 x 5 ml

Källa: FASS

Indikation: Slemmobiliserande, inhalation vid andningsbesvär.
RS-virus infektion.

Vanlig dos: Maxin: Inhalera i 1:a hand via munstycke, i övriga fall flöda med mask (eller slang) 1 cm från näsa och mun. Alla barn inhalerar 2 + 2 minuter förutom barn som klarar att använda munstycke och väger mindre än 20 kg. Dessa inhalerar 1 + 1 minut.

OBS! Inhalation 2 + 2 minuter (alt 1 + 1 min) ordinerar som 2 separata inhalationer.

Aiolos: 2 ml inhaleras

Inhalationerna upprepas ca var tredje timme, max 12 gånger per dygn.

Kommentar: Kan vid inhalation blandas med budesonid, salbutamol, ipratropiumbromid eller acetylcystein.

Referens - Det blåa fältet innehåller klickbar länk till referensen

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus: Gemensamt <http://gamlainuti.karolinska.se/upload/202431/RSV%20PM%20AKUT.pdf>
PM för Stockholms Barnsjukhus: RS-virus-infektion