

## Oseltamivir oralt (Tamiflu), kapslar

---

**Arbetsmiljö** Allergirisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., -

**Administreringssätt**

Oralt

Enteralt i sond: Skölj efter med vatten vid administrering i sond.

---

**Vanlig indikation och dos**

**Behandling av influensa (känsliga influensastammar)**

Barn 1 - 12 år:

10 - 15 kg: 30 mg x 2

Över 15 kg - 23 kg: 45 mg x 2

Över 23 kg - 40 kg: 60 mg x2

Över 40 kg: 75 mg x 2

Behandlingen ska pågå i 5 dagar. Vid nedsatt njurfunktion övervägs dosering 1 gång dagligen.

**Profylaxbehandling av influensa**

Barn 1 - 12 år:

10 - 15 kg: 30 mg x 1

Över 15 kg - 23 kg: 45 mg x 1

Över 23 kg - 40 kg: 60 mg x 1

Över 40 kg: 75 mg x 1

Profylaxbehandlingen ska pågå i 10 dagar

---

**Hållbarhet preparat:**

Tamiflu (Registrerad Produkt)

75 mg, Kapsel, hård

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C

---

**Övrig information**

Detta blad gäller för Tamiflukapslar 30, 45 samt 75 mg.

Barn som inte kan svälja kapslar bör i första hand använda Tamiflu oral suspension. För barn som inte vill svälja den orala suspensionen kan kapslarna

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-11-11 11:01:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-25 13:52:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2971

Versionsnummer: 1.0

Giltig fr o m: 2015-11-25 13:52:21

Utskriftsdatum: 2015-11-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Oseltamivir oralt (Tamiflu), kapslar

öppnas och dess innehåll blandas i maximalt 1 tesked lämpligt sötat livsmedel (för att dölja den bittra smaken). Förslag på livsmedel är socker upplöst i vatten, chokladsås, bär-/fruktsaft, dessertsåser (som t.ex. kolasås). Blandningen ska röras om och hela innehållet ska ges till patienten.

Behandlingseffekt tveksam under den första levnadsmånaden pga nyfödda barns omogna leverenzym. Oseltamivir är en pro-drug som måste metaboliseras till oseltamivirkarboxylat.

Erfarenhet av behandling med Tamiflu till barn under 1 år är begränsad. För barn under 1 månad finns begränsade data med dosen 2 mg/kg.

---

### Referens/Länk

FASS Tamiflu, Hämtat: 2015-11-11

<http://www.fass.se/LIF/product?16&userType=2&nplid=20110127000013&docType=6>

Internetadress Läkemedelsverket - Tamiflu, Hämtat: 2015-11-11

<https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Rekommenderad-dos-Tamiflu-till-barn-under-1-ar-vid-pandemisk-influensa-ett-fortvilligande/>

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2015-11-25

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show-grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show-grade)

### Substansspecifika uppgifter

oseltamivir, J05AH02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=ID11EHMUFD5HK1CSR&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-11-11 11:01:59

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-11-25 13:52:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2971

Versionsnummer: 1.0

Giltig fr o m: 2015-11-25 13:52:21

Utskriftsdatum: 2015-11-25

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

