

COROTROP, IV inf
milrinon 0,1 mg/ml
enl spädn-instruktion

<i>inj vätska</i>			<i>IV inf</i>
1 mg/ml		glukos 50 mg/ml alt glukos 100 mg/ml	0,1 mg/ml
1 ml	+	9 ml	= 10 ml

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim rt
Hållbarhet originalförp: Förvaras vid högst 30 C.

Varunummer: 433896, Corotrop inj 1mg/ml, 10 x 10 ml

Källa: FASS

Indikation: Forfordiesterasantagonist för korttidsbehandling för att öka cardiac output exempelvis vid vänsterkammarsvikt.

Vanlig dos: Obs! Ordineras i samråd med barnkardiolog. Laddningsdos 50-75 mikrogram/kg på 30-60 minuter (vid hypotension, reducera initialdos eller ge volym) därefter 30-45 mikrogram/kg/tim som kontinuerlig infusion i 2-3 dagar (vanligtvis 12 timmar efter hertkirurgi). Reducera dos vid njurfunktionsnedsättning.

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för milrinon 0,1 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
30 mikrog/kg/tim	0,15 ml/tim	0,30 ml/tim	0,60 ml/tim	0,90 ml/tim
45 mikrog/kg/tim	0,23 ml/tim	0,45 ml/tim	0,90 ml/tim	1,35 ml/tim