



Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL

(ex Corotrop)

EN-STEGSSPÄDNING

Milrinon (ex Corotrop)		Glukos 100 mg/mL		INF
1 mg/mL	+		=	0,1 mg/mL
2 mL		18 mL		20 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Milrinon (ex Corotrop)		Glukos 50 mg/mL		INF
1 mg/mL	+		=	0,1 mg/mL
10 mL		90 mL		100 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Laddningsdos

Nyfödda: 30 - 60 min

För nyfödda med GA mindre än 30 veckor ska laddningsdosen ges på 3 timmar.

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 60 min

Intravenös infusion (kontinuerlig): Underhållsdos

RIMLIG DOS för Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,25 mikrog/kg/min	0,15 mL/tim	0,75 mL/tim	1,5 mL/tim	7,5 mL/tim
0,75 mikrog/kg/min	0,45 mL/tim	2,25 mL/tim	4,5 mL/tim	22,5 mL/tim

0,25 mikrog/kg/min motsvarar 0,15 mL/kg/tim

0,75 mikrog/kg/min motsvarar 0,45 mL/kg/tim

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vänsterkammarsvikt, kärldilaterande

Obs! Ordineras i samråd med barnkardiolog eller BIVA.

Nyfödda:

Ev. laddningsdos 50 - 75 mikrogram/kg (vid hypotension, reducera initaldos)

Underhållsdos 0,25 - 0,75 mikrogram/kg/min

Barn 1 mån - 18 år:

Ev. laddningsdos 50 mikrog/kg

Underhållsdos 0,25 - 0,75 mikrog/kg/min

Vanlig behandlingstid 2 - 3 dagar. Start 12 timmar efter hjärtkirurgi.

Reducera dos vid njurfunktionsnedsättning. 50 - 75% av normaldos om estimerat GFR är mindre än 50 mL/min/1,73 m²

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

NeoFax

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2973

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-05-09

ePedID: 2973

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-05-09

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-05-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL

(ex Corotrop)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Milrinon (ex Corotrop) (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla.

0,1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.