

MIDAZOLAM PANPHARMA 0,2 mg/ml, IV inf

midazolam 0,2 mg/ml

enl spädn-instruktion

OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

<i>inj lösn</i>		<i>IV inf</i>
1 mg/ml	glukos 50 mg/ml	0,2 mg/ml
2 ml	+ 8 ml	10 ml

Administrering: 2-5 min intermittenta injektioner alt kontin inf

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt

Hållbarhet originalförp: Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Sparas inte efter första uttag.

Källa: FASS

Indikation: Kramper. Behov av sedering.

Vanlig dos: Krampbehandling: Laddningsdos 0,1 -0,3 mg/kg; underhållsdos (0,01-) 0,1-0,4 mg/kg/tim Sedering: intermittent 0,05-0,3 mg/kg; kontin 0,05 mg/kg/tim >v 32; 0,03 mg/kg/tim <v 32

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för midazolam 0,2 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
INF 0,05 mg/kg/tim	0,13 ml/tim	0,25 ml/tim	0,50 ml/tim	0,75 ml/tim
INF 0,4 mg/kg/tim	1,00 ml/tim	2,00 ml/tim	4,00 ml/tim	6,00 ml/tim