

Sufenta NASALT 50 mikrog/mL

Sufentanil

En förutsättning för att använda sufentanil är erfarenhet av att upprätta fri luftväg, kunna hantera opioidöverdosering och ha tillgång till ventilationsutrustning.

Lösningen ges utspädd. Mucosal Atomization Device (MAD). MAD är en engångsnippel med sprayfunktion som appliceras på en 1 ml-spruta.

Sufentanil har en hög fettlöslighet och ett pH som gör att preparatet har ett snabbt upptag och inte svider vid nasal administrering.

Hållbarhet preparat:

Sufenta (Registrerad Produkt)

● 50 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Se förpackningen

Administreringsätt

Nasalt: Administreras utspädd nasalt 15 - 25 minuter innan behandlingstillfälle. Nasal tillförsel ges med fördel som spray. För att kunna anpassa doseringen efter patientens vikt används en Mucosal Atomization Device (MAD). MAD är en engångsnippel med sprayfunktion som appliceras på en 1 ml-spruta.

Administrera 0,1 - 0,2 mL i taget så att doseringen blir rätt anpassad efter patientens vikt.

Sedering blir märkbar efter 10 - 15 minuter och maximal analgetisk effekt inträder efter 20 - 25 minuter.

Vanlig indikation och dos

Smärtlindring inför procedur.

Akut smärta eller premedicinering då intravenös infart saknas.

0,5 - 1,5 mikrogram/kg (det lägre intervallet vid kombination med Ketanest eller Dexdor)

Övrig information

Kan administreras ensamt eller i kombination med Ketanest eller Dexdor.

Referens/Länk

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2014-06-10

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 13:52:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 13:52:10

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3006

ID/spårnummer: 595

Giltig fr o m: 2015-03-24 13:52:14

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Sufenta NASALT 50 mikrog/mL

Sufentanil

En förutsättning för att använda sufentanil är erfarenhet av att upprätta fri luftväg, kunna hantera opioidöverdosering och ha tillgång till ventilationsutrustning.

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 13:52:14
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 13:52:10
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3006
ID/spårnummer: 595
Giltig fr o m: 2015-03-24 13:52:14
Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

