

NEORECORMON, SC inj
erytropoietin 2000 E/0,3 ml spruta

Beredningsinstruktion: 1. Utgå ENDAST från Neorecormon 2000 E/ 0,3 ml.

2. Plocka fram insulinsprutor BD Micro-Fine+ 0,3 ml (0,30mm(30G)x8mm). Dessa är graderade för administrering av Insulin 100 E/ml. Detta innebär att dosen som ska dras upp måste översättas enligt nedanstående:

66 E Neorecormon = 0,01 ml = 1 E på insulinsprutan.
132 E Neorecormon = 0,02 ml = 2 E på insulinsprutan.
198 E Neorecormon = 0,03 ml = 3 E på insulinsprutan.
264 E Neorecormon = 0,04 ml = 4 E på insulinsprutan.
330 E Neorecormon = 0,05 ml = 5 E på insulinsprutan.
660 E Neorecormon = 0,10 ml = 10 E på insulinsprutan.
1320 E Neorecormon = 0,20 ml = 20 E på insulinsprutan.
1980 E Neorecormon = 0,30 ml = 30 E på insulinsprutan.

3. Ta bort gummi-hatten på Neorecormon-sprutan (2000E/0,3ml) och för över endast den ordinerade volymen till "insulinsprutan". Ta bort eventuell luft.

Hållbarhet efter iordningställande: Kasserar efter första dosuttag.
Hållbarhet originalförp: Förvaras i kyl i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Varunummer: 510255, NeoRecormon inj 2000IE, 6 x 0,3 ml

Källa: FASS

Indikation: Anemi

Vanlig dos: 250 E/kg 3-5 ggr/vecka
