

Eusaprim, IV inf  
Trimetoprim/Sulfametoxazol inf lösn  
enl spädn-schema

Vid behov av spädning av större volymer se sid 2.

<i>inf konc</i>				<i>IV inf</i>
		NaCl 9 mg/ml		inf lösn
1,25 ml	+	31,25 ml	=	32,5 ml

Beredningsinstruktion: Varje 1 ml infusionskoncentrat ska spädas med 25 ml NaCl 9mg/ml.

Administrering: Intravenös infusion under 60 min (max 1,5 h).

Hållbarhet efter iordningställande: Används omedelbart;

Varunummer: 415166, Eusaprim konc inf lö 16mg/80mg, 10 x 5 ml

Källa: FASS

Indikation: Systemisk bakteriell infektion, pneumocystis carinii

Vanlig dos: Ordinationen sker i ml av ospädd infusionskoncentrat som därefter blandas enligt instruktionen ovan.

OBS ! Ska inte ges till barn under 6 veckor.

Systemisk bakteriell infektion

Barn 6 veckor-5 mån: 1,25 ml morgon och kväll.

Barn 6 mån-5 år: 2,5 ml morgon och kväll.

Barn 6-12 år: 5 ml morgon och kväll.

Ovanstående barndosering motsvarar en ungefärlig mängd av 6 mg trimetoprim/kg kroppsvikt/dag och 30 mg sulfametoxazol/kg kroppsvikt/dag delad i två lika doser.

Vuxna och barn över 12 år: 2 ampuller (å 5 ml) morgon och kväll. Högsta dos är 3 ampuller (å 5 ml) EUSAPRIM morgon och kväll (maxdosen bör ej ges mer än 3 dagar i rad).

Eusaprim, IV inf

Trimetoprim/Sulfametoxazol inf lösn

enl spädn-schema

Vid sepsis kan högre doser behöva ges, motsvarande 20 mg sulfa/kg x 2.

Pneumocystis jiroveci-pneumoni (PCP):

0,42 ml/kg x 3 (detta motsvarar 20 mg trimetoprim och 100 mg sulfametoxazol/kg/dygn = 1,25 ml/kg/dygn).

Nedtrappande dos och övergång till peroral administration efter terapivar i samråd med infektionskonsult. Vid primärt påverkad saturation bör patienten även behandlas med Prednisolon motsvarande 40 mg/kvm kroppsytta/dygn.

---

Kommentar: För vägledning av andra spädningsvolymer se nedan:

2,5 ml inf konc + 62,5 ml NaCl 9 mg/ml = 65 ml inf lösn

5 ml inf konc + 125 ml NaCl 9 mg/ml = 130 ml inf lösn

10 ml inf konc + 250 ml NaCl 9 mg/ml = 260 ml inf lös

Referens - Det blåa fältet innehåller klickbar länk till referensen

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus: Sepsis

<http://zamlainuti.karolinska.se/upload/Akutvårdsverksamheten.%20Barn/Bakteriell%20infektion.pdf>