



Immunoglobulin intravenös inf 100 mg/mL

(ex Kiovig, Privigen)

Risk för reaktion vid administrering. Övervaka patienten noggrant under hela infusionsperioden.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Immunoglobulin infusionsvätska 100 mg/mL (Kiovig, Octagam, Privigen, Pangyza, Gamunex) och 100 g/L (Intratect)

Alt. 2: Immunoglobulin pulver och vätska till infusionsvätska (Gammagard S/D)

OBS! Produkterna är ej utbytbara.

EN-STEGLÄKNING Alt. 2

Gammagard S/D	Medföljande vätska	INF
5 g	+	= 100 mg/mL
1 st	48 mL	48 mL

Beredningsinstruktion:

Observera att volymen medföljande spädningsvätska är mer än vad som ska användas för upplösning av pulvret. Volymen som ska användas för upplösning av pulver är den som anges ovan. För mer information se bipacksedel.

EN-STEGLÄKNING Alt. 2

Gammagard S/D	Medföljande vätska	INF
10 g	+	= 100 mg/mL
1 st	96 mL	96 mL

Beredningsinstruktion:

Observera att volymen medföljande spädningsvätska är mer än vad som ska användas för upplösning av pulvret. Volymen som ska användas för upplösning av pulver är den som anges ovan. För mer information se bipacksedel.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kontroll av puls och blodtryck ska ske en gång före infusion OCH då maximal infusionstakt uppnåtts. Även vanligt med ytterligare kontroll efter exempelvis halva infusionstiden.

Olika immunoglobulinprodukter är ej utbytbara med varandra, antikroppsinnehållet kan variera se Övrig information. Behåll samma preparat vid upprepad behandling. Avrunda om möjligt till hela förpackningsstorlekar.

Immunbrist

Nyfödda: 0,5 - 0,75 g/kg x 1

Trombocytopeni

Nyfödda: 0,5 - 1 g/kg x 1

Dosen kan upprepas vid behov.

Svår isoimmunisering som kräver utbytestransfusion

Profylax

Nyfödda: 0,5 g/kg

Underhållsbehandling

Nyfödda: 1 g/kg

Ges under 2 timmar.

Behandlingen kan upprepas efter 12 timmar.

Sepsis (låg evidens)

Nyfödda: 0,5 - 1 (- 2) g/kg

Dosen kan upprepas vid behov.

Autoimmuna CNS-tillstånd, Guillain Barre syndrom, epilepsi, mm

Barn 1 mån - 18 år: 1 g/kg x 1

Behandlingslängd: 2 dygn

Immuntrombocytopeni (ITP)

Barn 1 mån - 18 år: 0,8 - 1 g/kg x 1, kan upprepas en gång inom 3 dagar.

Alternativt 0,4 g/kg x 1, ges i 2 - 5 dagar.





Immunoglobulin intravenös inf 100 mg/mL

(ex Kiovig, Privigen)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Vissa allvarliga biverkningar kan bero på infusionshastigheten och det är därför viktigt att följa de startdoser som finns för respektive preparat och endast öka infusionshastigheten om patienten tolererar den förra hastigheten väl. Beroende på grad av biverkning/reaktion måste infusionshastigheten sänkas eller infusionen avbrytas.

FÖRSLAG PÅ GENERELLA INFUSIONSHASTIGHETER (infusionshastigheter för specifika preparat, se Övrig information):

Nyfödda: Starthastighet: 0,5 mL/kg/tim. Dosökning var 15:e - 30:e minut.

Maxhastighet: 5 mL/kg/tim

Barn 1 mån - 18 år: För initial samt maximal infusionshastighet se respektive preparat. Startdosen ges under 30 minuter, om patienten tolererar detta väl dubblas dosen varje kvart till maximal infusionshastighet för aktuellt preparat.

Vissa immunglobuliner har en högre maximal infusionshastighet för patienter med Primär immunbristsyndrom, PID.

Vid behov kan administrering ske som kontinuerlig infusion.

Biologiskt läkemedel. Enligt författnings HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

RIMLIG DOS för Immunoglobulin intravenös inf 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 g/kg	5 mL	25 mL	50 mL	250 mL
1 g/kg	10 mL	50 mL	100 mL	500 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Immunoglobulin (ex Kiovig, Privigen) (registrerad produkt)

100 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen vid högst 25°C. Får ej frysas.

Ljuskänsligt. Används inom 12 tim rumstemp eller 24 tim kyl efter öppnande.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kawasaki sjukdom

Behandling påbörjas så snart diagnosen är ställd, helst inom 7 dagar från symtomdebut.

Barn 1 mån - 18 år: 2 g/kg x 1 som en engångsdos under 8 - 12 timmar. Överväg uppdelad dos över 48 timmar om barnet har hjärtpåverkan och ej klarar volymbeslastning. Ges tillsammans med acetylsalisylsyra.

Stamcellstransplantation

Behandling är aktuell vid IgG under 4 g/L i det prov som tas innan transplantation.

Barn: 0,5 g/kg/VECKA fram till "take".

Därefter ges samma dos var 4:e vecka under 3 mån.

Om patientens utgångs-IgG är under 1 g/L kan två doser om 0,5 - 0,8 g/kg ges med ett par dagars mellanrum.

Dosering styrs av uppmätt plasma-IgG (dalvärde) vanligen före 3:e dosen vid nyinsatt behandling och därefter halvårssvis. Målvrde ca IgG 6 - 8 g/L, eller att patienten har så få infektioner som möjligt.





Immunoglobulin intravenös inf 100 mg/mL

(ex Kiovig, Privigen)

ÖVRIG INFORMATION

Flebogamma: Används ej till barn under 2 år på grund av innehållet av sorbitol (eventuell risk för fruktosintolerans).

Preparatspecifika infusionshastigheter enligt FASS:

Preparat:	Starthastighet:	Maxhastighet:	Maxhastighet PID*:
Gammagard	0,5 mL/kg/tim	4 - 8 mL/kg/tim	
Gamunex	0,6 - 1,2 mL/kg/tim	4,8 - 8,4 mL/kg/tim	
Intratect	max 1,4 mL/kg/tim	1,9 - 8 mL/kg/tim	
Kiovig	0,5 mL/kg/tim	6 mL/kg/tim	8 mL/kg/tim
Octagam	0,6 mL/kg/tim	7,2 mL/kg/tim	
Panzyga	0,6 mL/kg/tim	4,8 mL/kg/tim	8,4 mL/kg/tim
Privigen**	0,3 mL/kg/tim	4,8 mL/kg/tim	7,2 mL/kg/tim

* PID = primära immundefekter

**För att erhålla infusionshastighets-schema för Privigen klicka på referens "räkne-hjälp" nedan, fyll sedan i alla fält för dos, vikt och infusionshastighet och skriv ut. För infusionssteg 1 - 3 bör infusionshastigheten ej överstiga 2,4 mL/kg/tim.

Innehåll:

Olika immunoglobulinprodukter är ej utbytbara med varandra, antikroppsinnnehållet kan variera. Behåll samma preparat vid upprepad behandling. Kan finnas spår av natrium i samtliga preparat.

Namn	Hjälpmänna	% IgG	Osmol	pH	IgA mg/mL
Gammagard	Glukos	≥ 95	-	-	≤ 0,003
Gamunex	Glycin	≥ 98	238	-	≤ 0,084
Interact	Glycin	≥ 96	-	-	≤ 1,8
Kiovig	Glycin	≥ 98	240 - 300	4,6 - 5,1	≤ 0,14
Octagam	Maltos	≥ 95	< 350	5,1 - 6,0	≤ 0,2
Panzyga	Glycin	≥ 95	≥ 240	4,5 - 5,0	≤ 0,3
Privigen	L-prolin	≥ 98	320	4,6 - 5,1	≤ 0,025





Immunoglobulin intravenös inf 100 mg/mL

(ex Kiovig, Privigen)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Räkne-hjälp för infusionshastighet för Privigen

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/Privigeninfusionsschema.xlsm

Internetadress VGR, Alfresco - SCT Intravenös immunoglobulin

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/21268/SCT%20-%20Intraven%C3%B6s%20immunglobulin.pdf?a=false&guest=true>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Kawasaki sjukdom

<http://reuma.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3039

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-02-20

ePedID: 3039

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-02-21

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-02-21

KONTROLLERAT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT