

## Läkemedel för injektion eller infusion

## REMIFENTANIL TEVA/ULTIVA, INJ/INF (Obs 2 steg)

remifentanil 20 mikrog/ml

enl spädn-instruktion

	<i>inf subst</i>			<i>stamlösning</i>
<b>steg 1</b>	1 mg		NaCl 9 mg/ml	1 mg/ml
	pulver	+	1 ml	= 1 ml
<b>steg 2</b>	<i>stamlösning</i>			<i>INJ/INF</i>
	1 mg/ml		NaCl 9 mg/ml alt glukos 50 mg/ml	20 mikrog/ml
	1 ml	+	49 ml	= 50 ml

Beredningsinstruktion: Remifentanil Teva är upphandlat. Tidigare användes Ultiva.

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim rt. Stamlösningen får pga risk för förväxling inte sparas.

Källa: FASS

Indikation: Procedurmärta. CAVE svår bradykardi. Om prematurt barn rekommenderas premedicinering med atropin.

Vanlig dos: Injektion: 0,5-1 microgram/kg/dos

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för remifentanil 20 mikrog/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
0,5 mikrog/kg/dos	0,01 ml	0,03 ml	0,05 ml	0,08 ml
1 mikrog/kg/dos	0,03 ml	0,05 ml	0,10 ml	0,15 ml