

Läkemedel för injektion eller infusion

Abbotycin, IV inf (Obs 2 steg)

erytromycin 5 mg/ml

enl spädn-schema

Spädningsinstruktion (OBS 2 stegs-spädning)

	<i>inj substans</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1	1 gram		sterilt vatten	50 mg/ml
	1 st ampull	+	20 ml	= 20 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inf</i>
steg 2	50 mg/ml		glukos 50 mg/ml alt NaCl 9 mg/ml	5 mg/ml
	20 ml	+	180 ml	= 200 ml

Administrering: Infusion under minst 1 tim pga kärlretande egenskaper

Hållbarhet efter iordningställande: Stamlösning får INTE sparas pga förväxlingsrisk. Bruksfärdig lösning hållbar 12 tim (NaCl 9 mg/ml) och 6 tim (glukos 50 mg/ml) i rumstemperatur.;

Varunummer: 405001, Abbotycin insubst 1g, 1 g

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt lokala läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: 1) Systemisk infektion 2) Tarmstimulerande behandling

Vanlig dos: Infektion: Neo: 10 mg/kg x 2-4; 1 mån-18 år: 12,5 mg/kg x3 (-4), max 4 gram/dygn.

Tarmstimulerande behandling: 3 mg/kg x3 (-4), under max 2 dygn. Max 1 gram/dygn.

Vanlig dos	1 kg	5 kg	10 kg	40 kg
Tarmstimulering 3 mg/kg	0,60 ml	3,00 ml	6,00 ml	24,00 ml
Infektion 12,5 mg/kg	2,50 ml	12,50 ml	25,00 ml	100,00 ml

Referens/länk

BNF-C:

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnf/c/current/3851.htm>Ped Dosage Handbook, Taketomo, <http://www.lexi.com>:<http://online.lexi.com/crisal/servlet/crionline?a=doc&bc=pdf&f&mn=&id=2841043>

Teddy Bear:

Godkänd av apotekare: Åsa Andersson/Per Nydert 2012-03-29
Godkänd av läkare: Synnöve Lindemalm/Jonas BernerIdentifieringsnummer: 3043
Sida 1 av 2

Abboticin, IV inf (Obs 2 steg)

erytromycin 5 mg/ml

enl spädn-schema
