

Amoxicillin + klavulansyra (Spektramox) oral susp 50 + 12,5 mg/mL

Amoxicillin and enzyme inhibitor

Hållbarhet preparat:

Spektramox (Registrerad Produkt)

- 50 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Färdigberedd oral suspension förvaras i kylskåp och är hållbar 7 dygn.

Arbetsmiljö

Allergirisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Infektion

Barn under 40 kg: 12,5 - 22,5 mg/kg x 2, max 70 mg/kg/dygn

Barn över 40 kg: 875 mg x 2, max 875 mg x 3

Luftvägsinfektion vid CF

13 mg/kg x 3 (motsvarande 40 mg/kg per dygn)

Urinvägsinfektion (efter odlingssvar)

Barn under 40 kg: 25 mg/kg x 3

Skelettfektion (tredjehandsalternativ vid uppföljande peroral behandling)

17 mg/kg x 3 (motsvarande 50 mg/kg/dygn)

Hundbett, kattbett

Barn under 25 kg: 20 mg/kg x 3, maxdos 1500 mg/dygn

Barn över 25 kg: 500 mg x 3

Behandlingstid 10 dygn

Etmoidit (lätta till måttliga symtom, men bakteriell misstanke)

20 mg/kg (avseende amoxicillin) x 3

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-05-25 14:53:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-05-25 14:42:58

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3068

ID/spårnummer: 715

Giltig fr o m: 2015-05-25 14:53:32

Utskriftsdatum: 2015-05-26

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Amoxicillin + klavulansyra (Spektramox) oral susp 50 + 12,5 mg/mL

Amoxicillin and enzyme inhibitor

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
20 mg/kg/dos	0,4 mL	2 mL	4 mL	20 mL

Övrig information Rekommenderade doser avser amoxicillin.
Förhållandet mellan amoxicillin och klavulansyra är 4:1 i denna beredning. Det finns även en oral suspension med styrkan 80 + 11,97 mg/mL (förhållande 7:1).

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Etmoidit, Hämtat: 2015-05-06

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID1F6F5E13103DE495C1257A2900419A33>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Skelettinfectioner hos barn, Hämtat: 2015-05-06

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID0E96D8E8EA7D6048C1257C3E003538B8>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Urinvägsinfektion hos barn, Hämtat: 2015-05-04

[http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07/\\$File/CEKG9FLBKV.pdf](http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07/$File/CEKG9FLBKV.pdf)

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-05-25 14:53:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-05-25 14:42:58

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3068

ID/spårnummer: 715

Giltig fr o m: 2015-05-25 14:53:32

Utskriftsdatum: 2015-05-26

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

