



Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn²⁺/mL

(Solvezink)

EN-STEGSSPÄDNING

Solvezink		Vatten (från kran)		ORAL LÖSN
45 mg				1,5 mg/mL
1 st	+	30 mL	=	30 mL

Beredningsinstruktion:

Låt Brustabletten lösas upp fullständigt innan administrering.
Innehåller 0,15 mmol natrium/mL.

Till infektionskänsliga patienter kan upplösning i sterilt vatten övervägas.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Tas omedelbart efter måltid.

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn²⁺/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	0,67 mL	3,33 mL	6,67 mL	-
22,5 mg	-	-	15 mL	-
45 mg	-	-	-	30 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Solvezink (registrerad produkt)

45 mg, Brustablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Efter första uttag ska röret förslutas noga varje gång. Hållbarhet angiven på förpackningen gäller även efter öppnande.

1,5 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Används direkt, sparas inte.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doser anges i mg av elementärt zink (Zn²⁺).

Zinkbrist

Nyfödda: 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 1 år (under 10 kg): 1 mg/kg x 1

Barn 10 - 30 kg: 22,5 mg (0,5 Brustablett) x 1 - 3

Barn över 30 kg: 45 mg (1 Brustablett) x 1 - 3

Acrodermatitis enteropathica

Nyfödda: 0,5 - 1 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 2

ÖVRIG INFORMATION

1 Brustablett innehåller bl.a.:

125 mg zinksulfat monohydrat = 45 mg Zn²⁺

106 mg natrium = 4,6 mmol Na

115,5 mg sorbitol

Risk för ackumulering vid akut njurfunktionsnedsättning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-08-21

ePedID: 3073

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-25

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT