

Hyperton Natriumklorid INH 3 % (30 mg/mL)

Sodium chloride

En-stegsspädning:	Addex-Natriumklorid		Sterilt Vatten		INH
	4 mmol/mL	+		=	3 %
	0,65 mL		4,35 mL		5 mL

Hållbarhet preparat:

Addex-Natriumklorid (Registrerad Produkt)

- 4 mmol/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning, Hållbar: Får ej sparas pga förväxlingsrisk

Hyperton Natriumklorid (Registrerad Produkt)

- 3 %, INHALATION, Hållbar: 12 tim rumstemp
-

Administreringssätt

Inhalation: Inhalera i AIOLOS

Vanlig indikation och dos

Virusbronkiolit

2 mL färdigblandad lösning inhaleras var 3:e timme dagtid (4 gånger, t ex kl 08, 11, 14 och 17)

Övrig information

Kombineras med fördel med inhalationer av fysiologisk natriumklorid var 3:e timme nattetid (4 gånger, t ex kl 20, 23, 02 och 05)

Referens/Länk

Personlig kontakt Mona-Lisa Engman, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Hämtat: 2014-12-18

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2014-12-18

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2014-12-15 13:29:45

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2014-12-18 13:58:13

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3082

ID/spårnummer: 486

Giltig fr o m: 2014-12-18 13:58:13

Utskriftsdatum: 2014-12-18

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

