



## Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Peritonealdialyslösning med tillsats av:

Tobramycin 10 mg/mL (Nebcina), se spädning nedan

Vankomycin 50 mg/mL, se spädning nedan

Heparin 5000 E/mL (vid fibrinbildning)

### EN-STEGSSPÄDNING Tobramycin

Tobramycin		NaCl 9 mg/mL		LÖSN
40 mg/mL	+		=	<b>10 mg/mL</b>
2 mL		6 mL		8 mL

### EN-STEGSSPÄDNING Vankomycin

Vankomycin		Sterilt Vatten		LÖSN
500 mg	+		=	<b>50 mg/mL</b>
1 st		10 mL		10 mL

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intraperitonealt

### ÖVRIG INFORMATION

APD = automatisk peritonealdialys

CAPD = kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Peritonit i samband med peritonealdialys

Barn 1 mån - 18 år:

APD

Tobramycin 10 mg/mL: 0,4 mL (4 mg)/L dialysat

Vankomycin 50 mg/mL: 0,3 mL (15 mg)/L dialysat

CAPD

Tobramycin 10 mg/mL: 0,6 mL (6 mg)/L dialysat

Vankomycin 50 mg/mL: 0,5 mL (25 mg)/L dialysat

Vid fibrinbildning tillsätts Heparin 5000 E/mL. Rutindos om ej särskild ordination finns: 250 E/L dialysat

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-12-12

ePedID: 3086

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-12-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**





## Dialys: Peritonealdialyslösning med tillsatser

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### **Tobramycin (registrerad produkt)**

40 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Brytampull, får ej sparas efter första uttag.

10 mg/mL, Lösning (eget)

HÅLLBAR: 12 timmar efter iordningställande.

#### **Vankomycin (från registrerad produkt)**

500 mg, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C i ytterförpackningen, ljuskänsligt.

50 mg/mL, Lösning (eget)

HÅLLBAR: Sparas ej efter första uttag.